

RANCHAPAJ®

RANCHAPAJ®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN QUÍMICA :

Metalaxyl 80 g/kg
Mancozeb 640 g/kg
Aditivos 280 g/kg

Reg. N° 526-97-AG-SENASA

Titular del Registro y Distribuidor:
AGRO KLINGE S.A.
Av. Separadora Industrial Mz. "E", Lote 12
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima-Perú.
Telf.: 348 -3887
R.U.C N° 20508704217

Formulador:
Tecnología Química y Comercio S.A.
Av. Separadora Industrial Mz. "E", Lote 12
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima -Perú.
Telf.: 348 -1103, Fax: 348 -1020
R.U.C N° 20307150981

PRODUCTO PERUANO

Lote N°:

F. de Formulación:

F. de Vencimiento:

Contenido Neto: 1 Kg

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

© Marca Registrada por **Tecnología Química y Comercio S.A.**

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en lugares secos y ventilados, lejos del calor.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Causa irritación moderada a los ojos. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela una copia de esta etiqueta.
- Su ingestión accidental, produce síntomas de intoxicación como sofocación, náuseas, vómitos, mareos, diarrea, gastritis y debilitamiento, flacidez, dificultad respiratoria, etc.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Si persiste la irritación acudir a un centro de asistencia médica.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO: Provocar el vómito dando de beber agua tibia con sal o introduciendo un dedo a la garganta. Hacer un lavado gástrico.

ANTÍDOTO: No existe antídoto específico. El tratamiento será sintomático.

En caso de **emergencia toxicológica** llamar a **CICOTOX, Telf.:0-800-1-3040**(Centro de Información, Control Toxicológico y Apoyo a la Gestión Ambiental)-Atención 24 horas.

Atención al cliente: Telf.:(01) 348-3887.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

© Marca Registrada por **Tecnología Química y Comercio S.A.**

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: RANCHAPAJ es un fungicida preventivo-curativo de amplio espectro, que combina la acción de dos fungicidas no relacionados, Metalaxyl de acción sistémica y Mancozeb con acción de contacto. Se aplica en pulverizaciones foliares en mezcla con agua, utilizando equipos de aspersión terrestre.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

USO ESPECÍFICO Y DOSIS:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)	
		kg/cil 200 L	Kg/ha		mancozeb	metalaxyl
TOMATE PAPA	"Hielo" o "Rancha" o "Seca seca"	Phytophthora infestans	0,5 - 1	2 - 3	3 14	2 0,2 0,5
AJÍ ROCOTO PIMIENTO	"Hielo"	Phytophthora infestans	0,5 - 1	2 - 3	14	10 10 1 1
SANDÍA MELÓN PEPINO	"Mildiu"	Pseudoperonospora cubensis	0,5 - 1	2 - 3	7	1 0,5 2 0,2 0,5
AJO CEBOLLA	"Mildiu"	Peronospora destructor	0,5 - 1	2 - 3	14	0,5 0,5 N.D. 2
LECHUGA	"Mildiu"	Bremia lactucae	0,5 - 1	2 - 3	7	10 2
TOMATE PIMIENTO PAPRIKA	"Azul" o "Morado"	Phytophthora capsici	0,5 - 1	2 - 3	14	2 1 1 0,5 1
VID	"Mildiu"	Plasmopara viticola	0,5 - 1	2 - 3	14	5 N.D. 0,5
COL COLIFLOR	"Mildiu"	Peronospora parasitica	0,5 - 1	2 - 3	14	0,5 0,5
PALTO	"Podredumbre radicular"	Phytophthora cinnamomi	0,5	-----	21	0,05 0,2

P.C.= Período de carencia **L.M.R.=Límite máximo de residuos** **N.D.= No determinado**
VOLUMEN DE APLICACIÓN: Cultivos bajos 400 a 600 L/ha, frutales 1 000 L/ha.
ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Iniciar las aplicaciones preferentemente en forma preventiva o cuando se observen los primeros síntomas. El intervalo de aplicación varía entre 10 a 14 días. Disminuir la frecuencia entre 5 a 7 días si el ataque es muy intenso.
PERÍODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada antes de las 24 horas de la aplicación.
FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.
COMPATIBILIDAD: Incompatible con los plaguicidas de reacción alcalina.
RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas."



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



Tamaño:

altura: 17.70 cm
ancho: 16.1 cm
profundidad: 8.1 cm

Colores:

Logo: Selección
Texto y logo: NEGRO
Banda: Azul pantone 293C