RANCHAPAJ®

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en lugares secos y ventilados, lejos del calor.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Causa irritación moderada a los ojos. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:
- Grupo Químico: Dithiocarbamato + Phenilamida.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele una copia de esta etiqueta.
- Su ingestión accidental, produce síntomas de intoxicación como sofocación, náuseas, vómitos, mareos, diarrea, gastritis y debilitamiento, flacidez, dificultad respiratoria, etc. Provocar el vómito dando de beber agua tibia con sal o introduciendo un dedo a la garganta. Hacer un lavado gástrico.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Si persiste la irritación acudir a un centro de asistencia médica.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:
ANTÍDOTO: No existe antídoto específico. El tratamiento será sintomático.
TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106.
ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.: (01) 641-0000.

CONDICIONES MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depósitela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Producto Peruano

RANCHAPAJ®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Metalaxyl	80 g/kg
Mancozeb	640 g/kg
Aditivos	csp 1 Kg

Reg. Nº 526-97-AG-SENASA

Titular del Registro:
ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.
Av. EL Derby 254. Int 306. Santiago de Surco. Lima-Perú.
Telf.: (01) 641-0000

Distribuidor:
AgroKlinge
a member of ADAMA
Agro Klinge S.A.
Av. El Derby N° 254,
Int. 306. Santiago de Surco.
Lima - Perú. Telf: (01) 641-0000

Formulador:
Tecnología Química y Comercio S.A.
Calle René Descartes N° 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima -Perú.
Telf.: 612-6565, Fax: 348 -1020
R.U.C N° 20307150981

Contenido Neto: 1 Kg

Nº de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en lugares secos y ventilados, lejos del calor.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
Causa irritación moderada a los ojos. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:
Grupo Químico: Dithiocarbamato + Phenilamida.
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele una copia de esta etiqueta.
Su ingestión accidental, produce síntomas de intoxicación como sofocación, náuseas, vómitos, mareos, diarrea, gastritis y debilitamiento, flacidez, dificultad respiratoria, etc. Provocar el vómito dando de beber agua tibia con sal o introduciendo un dedo a la garganta. Hacer un lavado gástrico.
En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Si persiste la irritación acudir a un centro de asistencia médica.
No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:
ANTÍDOTO: No existe antídoto específico. El tratamiento será sintomático.
TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106.
ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.: (01) 641-0000.

CONDICIONES MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depósitela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Producto Peruano

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: RANCHAPAJ es un fungicida preventivo-curativo de amplio espectro, que combina la acción de dos fungicidas no relacionados, Metalaxyl de acción sistémica y Mancozeb con acción de contacto. Se aplica en pulverizaciones foliares en mezcla con agua, utilizando equipos de aspersión terrestre.Metalaxyl Interrumpe la síntesis de ácidos nucleicos fúngicos - ARN ploymerasa 1 y Mancozeb actúa alterando el metabolismo de los lípidos. Actividad multisitio.
Modo de empleo: Se aplica en pulverizaciones foliares en mezcla con agua, utilizando equipos de aspersión terrestre.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)	
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/200 L	kg/ha		mancozeb	metalaxyl
TOMATE PAPA	"Hielo" o "Rancha" o "Seca seca"	*Phytophthora infestans*	0.5 - 1	2 - 3	3 14	2 0.2	0.5 0.05
AJÍ ROCOTO PIMIENTO	"Hielo"	*Phytophthora infestans*	0.5 - 1	2 - 3	14	10 10 1	10 10 1
SANDÍA MELÓN PEPINO	"Mildiu"	*Pseudoperonospora cubensis*	0.5 - 1	2 - 3	7	1 0.5 2	0.2 0.2 0.5
AJO CEBOLLA	"Mildiu"	*Peronospora destructor*	0.5 - 1	2 - 3	14	0.5 0.5	N.A. 2
LECHUGA	"Mildiu"	*Bremia lactucae*	0.5 - 1	2 - 3	7	10	2
TOMATE PIMIENTO PÁPRIKA	"Azul" o "Morado"	*Phytophthora capsici*	0.5 - 1	2 - 3	14	2 1 1	0.5 1 1
VID	"Mildiu"	*Plasmopara viticola*	0.5 - 1	2 - 3	14	5	1
COL COLIFLOR	"Mildiu"	*Peronospora parasitica*	0.5 - 1	2 - 3	14	5 N.A.	0.5 0.5
PALTO	"Podredumbre radicular"	*Phytophthora cinnamomi*	0.5	-----	21	0.05	0.2

P.C.= Período de carencia L.M.R.=Límite máximo de residuos N.A.= No aplica

VOLUMEN DE APLICACIÓN: Cultivos bajos 400 a 600 L/ha, frutales 1 000 L/ha.
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Iniciar las aplicaciones preferentemente en forma preventiva o cuando se observen los primeros síntomas. El intervalo de aplicación varía entre 10 a 14 días. Disminuir la frecuencia entre 5 a 7 días si el ataque es muy intenso. Considerando una (01) campaña al año para los cultivos de tomate, papa, ají, rocoto, pimiento, sandía, melón, pepino, ajo, cebolla, lechuga, tomate, pimiento, paprika, vid, col, coliflor y palto.
PERIODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada antes de las 24 horas de la aplicación.
COMPATIBILIDAD: Incompatible con los plaguicidas de reacción alcalina.
FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.
RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Etiqueta para uso exclusivo del SENASA

Tamaño:
altura: 17.70 cm
ancho: 16.1 cm
profundidad: 8.1 cm
Colores:
Logo: Selección
Texto y logo: NEGRO
Banda: Azul pantone 293C