

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- Peligroso si se inhala. Causa irritación moderada a los ojos.
 - Puede perjudicar a determinados organismos (Sistema nervioso) por exposición prolongada o repetida.
 - Mantener alejados a los niños y animales del lugar de la aplicación.
 - No aplicar en vientos contrarios al viento.
 - Uso de sus envases originales y almacenarlo herméticamente cerrado en lugares frescos y ventilados, alejado de fuentes de calor, bajo llave.
 - Usar máscara, respirador, guantes protectores, pantalón y camisa de manga larga al momento de preparar el caldo de aspersión y al aplicar el producto.
 - No comer, beber ni fumar durante la mezcla y aplicación del producto.
 - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
 - No se debe almacenar ni transportar conjuntamente con productos alimenticios (frescos o en conservas), bebidas, farijes ni medicinas.
 - Después de usar el producto, cambiarse de ropa, bañarse con abundante agua y jabón y lavar la ropa contaminada.
 - No reingresar a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.

- INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**
- Grupo químico: Ácido Aminofosfónico.**
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta. En caso de contaminación de la piel, lave inmediatamente las partes afectadas con abundante agua y jabón. Mantenga al paciente animado y caliente, al aire fresco y en posición horizontal. Lave inmediatamente los ojos contaminados con abundante agua pura durante 10 a 15 minutos. Si el producto ha sido ingerido induzca al vómito, solo si el paciente está consciente.
 - Antídoto: no existe antídoto específico.

TELEFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106

CISPROQUIM (línea gratuita): 0 800 50 847

BASF Peruana S.A.: 513 2505

- CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
 - Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
 - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
 - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**
- Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
 - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
 - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
 - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
 - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
 - En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



Basta®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:
Glufosinato de amonio 200 g/L
Aditivos c.s.p 1 L

Reg. PQUA N°183-SENASA

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO
POR: BASF Peruana S.A.
Av. O. R. Benavides 5915 - Callao Castilla
3911, Lima 100 Telf.: (01) 513 2500
Fax: (01) 513 2519

FORMULADO POR:
BASF Agricultural Solutions GmbH
Industriepark Hoechst 65926 Frankfurt am
Main Alemania

DISTRIBUIDO POR:
DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar N° 991, piso 9
Magdalena del Mar Lima - Perú
Telf.: (01) 501-1000

Contenido Neto: 20 L

N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

-Basta® es un herbicida de contacto, no selectivo, parcialmente sistémico, que sólo puede ser absorbido vía foliar. El glufosinato de amonio inhibe la actividad de la enzima glutamyl synthetase, perturbando el metabolismo de amonio en la planta, dando como resultado una acumulación de amoníaco (NH₃) en las células de la planta, destruyéndolas. Los efectos fitotóxicos son acelerados por la luz. **Grupo HRAC 10.**

-Agite el producto antes de utilizarlo. Llenar el tanque del equipo aplicador con agua limpia hasta la mitad en recipiente aparte mezclar el producto en agua hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque del equipo y complete el volumen de agua a utilizar. Realice la aplicación dirigida a la maleza utilizando un equipo con campana.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO		MALEZAS				DOSIS			*PC (días)	**LMR (ppm)
CULTIVO	Nombre Común	Nombre Técnico	L/ha	%	Lc/l 200 L					
Alcachofa	Yujo hembra Verdolaga	Amaranthus spp. Portulaca oleracea	2	-	1	25	0.1			
Cacao	Camiradora	Palibellia exaltata	3	0.75	1.5	14	0.1			
Café	Remolina	Paspalum spp.	3 - 5	0.75-1.25	1.5-2.5	14	0.1			
Caña de azúcar	Gramma china	Sorghum halepense	3	-	-	14	0.5			
Espárrago	Gramma dulce Hierba de gallinazo	Cynodon dactylon Sorghum halepense Chenopodium murale	2 - 2.5	-	1.2	1	0.2			
Marzano	Coquillo	Cyperus spp.	3 - 5	0.75-1.25	1.5-2.5	14	0.1			
Narajón	Gramma china	Sorghum halepense	3 - 5	0.75-1.25	1.5-2.5	14	0.1			
Papa acellera	Remolina	Paspalum spp.	3 - 5	0.75-1.25	1.5-2.5	14	n.a.			
Palo	Yujo hembra Gramma china Pajilla Tomatillo Moco de pavo	Amaranthus hybridus Sorghum halepense Chlois virgata Bidens pilosa Nicandra physaloides Echinochloa colonum	1.5 - 2	-	-	20	0.1			
Quinoa	Verdolaga Hierba gallinazo Anor seco Hierba mora	Portulaca oleracea Chenopodium murale Bidens pilosa Solanum nigrum	2	-	-	60	0.1			
Te	Yujo	Amaranthus viridis								
Vid	Hierba mora Verdolaga	Solanum nigrum Portulaca oleracea	1 - 3 1 - 3	0.25-0.75 0.25-0.75	0.5-1.5 0.5-1.5	14 14	0.1 0.2			

*PC = Periodo de Careda **LMR = Límite Máximo de Residuos
Nota: Las concentraciones en % están basadas en un gasto de agua promedio de 400L de agua por ha, cuando se aplican con pulverizadora manual de mochila.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: Debe aplicarse en post-emergencia, sobre malezas jóvenes de 15 a 20 cm de tamaño que tengan suficiente follaje. Se recomienda hasta dos aplicaciones por campaña.

Quinoa: aplicar en forma dirigida sobre malezas de 5 a 20 cm de tamaño con suficiente follaje; en plantas jóvenes de quinoa de aproximadamente 30 días de edad después de la siembra.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas

COMPATIBILIDAD: Se puede aplicar en mezcla con diuron, linuron, ametrina, alador, metribuzina, meblador, atrazina, dependiendo del cultivo.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

