

2.5 cm

26 cm

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

FORSEM® 80PM

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA**POLVO MOJABLE (WP)****COMPOSICIÓN:**

Captan..... 800 g/kg
Aditivos..... csp 1kg

Reg. PQUA N° 181-SENASA

Distribuidor:

AGRO KLINGE S.A.
Av. El Derby N° 254, Int. 306. Santiago
de Surco. Lima - Perú. Telf: (01) 641-0000

Titular del Registro:
ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.
Av. EL Derby 254. Int 306. Santiago
de Surco. Lima-Perú.
Telf.: (01) 641-0000

Formulador:
**Tecnología Química
y Comercio S.A.**
Calle René Descartes No 311,
Urb. Santa Raquel 2da Etapa,
Ate. Lima - Perú.
Telf.: 612-6565,
Fax: 348-1020

N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de vencimiento:

**Contenido
Neto: 400 g**

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

17 cm

19 cm

- PANTONE 293 C
- PANTONE Process Black C

2.5 cm

26 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- El producto es irritante para los ojos, la piel y el aparato respiratorio. Evite el contacto directo.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, en lugares secos y ventilados, lejos del calor.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Pftalimida
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele esta etiqueta.
- Su ingestión accidental produce síntomas de intoxicación como diarrea, náuseas, vómitos, debilidad muscular, hipotermia, anorexia. Provocar el vómito dando de beber agua tibia con sal o introduciendo un dedo a la garganta.
- Hacer un lavado gástrico evitando la aspiración del tóxico.
- No administrar leche, aceites comestibles ni alcohol.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Si persiste la irritación acudir a un centro de asistencia médica.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

Nota al médico: Antídoto: no existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.
Teléfono de emergencia: SAMU: 106. ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.: (01) 641-0000.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los organismos acuáticos; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

©Marca registrada

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: FORSEM 80 PM es un fungicida preventivo que actúa por contacto con efecto residual. Se aplica en el tratamiento de semillas y en pulverizaciones para el control de enfermedades que afectan a flores, frutos y hojas.

MODO DE EMPLEO:**ASPERSIONES FOLIARES**

Aplicar FORSEM 80 PM previa mezcla con agua, con equipos de aspersión terrestre. No aplicar con temperaturas mayores a 30 °C.

VOLUMEN DE APLICACIÓN: 400 a 600 L/ha

TRATAMIENTO DE SEMILLAS

MÉTODO "SLURRY" (semilla de frijol y algodón): Espolvorear la dosis indicada de FORSEM 80 PM sobre la semilla previamente humedecida, remover uniformemente la mezcla hasta cubrir las semillas totalmente.

MÉTODO DE INMERSIÓN (semilla de papa): Disolver 400 a 500 g de FORSEM 80 PM en 100 litros de agua. Sumergir los tubérculos por 2 a 3 minutos. Dejar escurrir y proceder a la siembra.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		Kg/ha	DOSIS		P.C (días)	L.M.R (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO		g/cil. 200 L	g/moch 20 L		
PAPA	"Hielo" "Rancha"	<i>Phytophthora infestans</i>	1.6 - 2	400 - 500	40 - 50	7	0.05
TOMATE	"Podredumbre de flores y frutos"	<i>Botrytis cinerea</i>	1.5 - 2.5	400 - 500	40 - 50	7	5
CLAVEL	"Mancha negra de la hoja"	<i>Alternaria dianthi</i>	2 - 3	500 - 700	50 - 70	7	--
ARÁNDANO	"Cabeza de clavo"	<i>Alternaria tenuissima</i>	--	400 - 500	--	3	20

TRATAMIENTO DE SEMILLA

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS	P.C (días)	L.M.R (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
ALGODÓN		<i>Rhizoctonia solani</i>	5 g/kg semilla 230 g/qq semilla	(*)	--
FRIJOL	"Chupadera"	<i>Fusarium oxysporum</i>	3 - 5 g/kg semilla 75 - 125 g/25 kg semilla	(*)	2
PAPA			400 - 500 g/100 L de agua/100 kg semilla	(*)	(*)

P.C. = Período de carencia / L.M.R. = Límite máximo de residuos
(*) No procede por ser tratamiento a la siembra

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Siendo el producto un fungicida de uso preventivo, realizar como máximo una sola aplicación por campaña cuando se observen los primeros síntomas ó las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

PERÍODO DE REINGRESO: 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con los plaguicidas de reacción alcalina y aceites agrícolas.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos indicados y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."



17 cm

19 cm

- PANTONE 293 C
- PANTONE Process Black C