

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
 "Manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION:**

Moderadamente peligroso por inhalación  
 Irritante a las vías respiratorias  
 Ligeramente irritante a los ojos y a la piel  
 Evítese el contacto con los ojos, piel y ropa.  
 Durante el manipuleo, mezcla y aplicación usar ropa y máscara protectora y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.  
 Mantener alejados a los niños y animales del lugar donde se manipula el producto.  
 No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.  
 Mantenga este producto en lugar seco, alejado de fuentes de calor y su empaque en perfectas condiciones.  
 No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, medicinas de uso humano o animal.  
 Lávese con abundante agua y jabón después de manipular el producto.  
 No aplicar en dirección contraria al viento.  
 No utilizar el envase para almacenar alimentos o bebidas.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

Grupo químico: Triazinas  
 En caso de intoxicación lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.  
 En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. En ambos casos consultar al médico,  
 En caso de emergencia toxicológica llamar a CICOTOX, Teléf.: 328-7398-, ESSALUD, Telef. 328-7398- CETOX. Telef: 273-2318- HELM DEL PERU SAC, Telex: 2550845-LIMA..

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:**

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.  
 Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales, para ello, no botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL AMBIENTE:**

Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos  
 Peligroso para organismos acuáticos  
 Peligroso para abejas. No aplicar en épocas de floración  
 No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.  
 No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.  
 Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros  
 Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada  
 El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables  
 En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

# Cyroforte 75 WP

## INSECTICIDA AGRICOLA

### POLVO MOJABLE – WP

**Composición :**

Cyromazine.....750 g/kg  
 Aditivos ..... csp 1 kg

Reg. PQUA N° - SENASA

Contenido neto :

Lote N° :

Fecha de formulación :

Fecha de vencimiento:

TITULAR DEL REGISTRO : HELM DEL PERU SAC

Importador:



**HELM DEL PERU SAC**

Alameda Poeta de la Rivera N°416  
 Urbanización La Encantada -  
 Chorrillos  
 Telef: 2550844 - 2550845  
 LIMA - PERU  
**JIANGXI HEYI  
 CHEMICAL CO., LTD.**  
 Longcheng Town, Pengze county -  
 Jiangxi – China

Formulador:

**NO EXPLOSIVO NO INFLAMABLE NO CORROSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**CYROFORTE 75 WP** es un regulador de crecimiento de los insectos, que inhibe el desarrollo de las larvas, impidiendo la emergencia de los insectos adultos.

**USOS:**

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

Cultivos	Plagas		Dosis		Periodo de carencia (días)	LMR ppm
	Nombre común	Nombre Técnico	200 L. de Agua.	Por Ha.		
Apio	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	70 g	0.210 kg	21	5
Frijol	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	70 g	0.210 kg	14	0.5
Lechoga	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	70 g	0.210 kg	21	5
Papa	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	70 g	0.210 kg	21	0.5
Tomate	Mosca minadora*	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	70 g	0.210 kg	7	0.5

L.M.R. = Límite máximo de residuos

**FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:**

Para la aplicación se puede usar cualquier equipo de aspersión sea manual ó mecánico, tratando en todos los casos de lograr cobertura uniforme.  
 Realizar como máximo tres aplicaciones por campaña y dos campañas al año

**PERIODO DE REINGRESO:**

24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

Se puede mezclar con los plaguicidas más comunes excepto con los de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:**

No es fitotóxico siguiendo las recomendaciones de la etiqueta.. Se puede emplear en todos los estados de desarrollo de la planta, eliminado las plagas sin dañar el cultivo. En flores no cambia su apariencia, ni produce decoloración.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO**



