

# AGROGIBB®

Regulador de Crecimiento de Plantas

TABLETAS SOLUBLES - ST

CAPEAGRO

Regulador de Crecimiento de Plantas

# AGROGIBB®

CAPEAGRO

TABLETAS SOLUBLES - ST

## ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA LA ETIQUETA EN SU TOTALIDAD MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

### PRECAUCIONES:

Permitir que intervengan sólo personas adultas y con experiencia en el manejo de productos fitosanitarios. Usar equipo de protección personal adecuado durante la manipulación del producto como guantes y botas de goma. Durante la aplicación usar protector facial, que impide el contacto del producto con los ojos; guantes, pechera y botas, que impidan el contacto del producto con la piel. En aplicaciones en altura usar protector facial. Evitar inhalaciones y contacto con ojos, nariz y boca. No comer, beber o fumar durante su manipulación o aplicación. Después del trabajo cámbiese y lave la ropa del trabajo.

### PRIMEROS AUXILIOS:

**Exposición Oral:** En caso de ingestión accidental se debe proceder a inducir el vómito introduciendo un dedo a la garganta y luego consultar con un médico.

**Exposición por Inhalación:** Los individuos deben ser alejados en caso de exposición a una concentración alta del producto. Se recomienda evitar su inhalación.

**Exposición Ocular:** Lavar inmediatamente con agua durante al menos 15 minutos. Observar la irritación del ojo y buscar ayuda médica si la irritación llega a ser significativa.

**Exposición Cutánea:** Lavar la zona afectada de la piel inmediatamente con abundante agua y jabón neutro. Si ocurre irritación de la piel o eritema, el paciente debe buscar ayuda médica.

**Antídotos:** No tiene antídoto específico. Si el ácido giberélico ha sido ingerido no hay ninguna razón para esperar efectos adversos.

**EMERGENCIAS:** Llamar a CICOTOX: 0800-13040. CIPROSQUIM: 0800-50847 ESSALUD: 0800-10200. CAPEAGRO S.A.C.: 01 445-5346.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin. No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

### INDICACIONES DE USO:

**AGROGIBB** es un regulador hormonal que estimula el crecimiento y desarrollo de las plantas. Aplicado en mínimas concentraciones, actúan en los procesos fisiológicos y morfológicos de las plantas.

**Preparación y aplicación:** Llenar el cilindro con la cantidad de agua requerida, sacar en un balde 1 litro de agua del cilindro para disolver las tabletas de **AGROGIBB** a la dosis requerida, una vez disueltas vaciar al cilindro y remover para que quede una mezcla uniforme. El modo de aplicación se realiza de acuerdo al objetivo que se quiere en el cultivo.

### FITOTOXICIDAD:

No se recomienda el uso del producto en naranjos de la variedad Valencia.

### COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto los productos de reacción alcalina.

### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

### USO ESPECÍFICO DEL PRODUCTO Y DOSIS

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	DOSIS Tab/200 L	*PC (días)	*LMR (ppm)
Vid (var. con/sin pepa)	Aplicar cuando los granos tengan de 5 a 6 mm de diámetro, incrementarán de tamaño.	4 - 5	14	5
Papa	Para interrumpir la latencia de tubérculos y estimular el brotamiento uniforme. Tratamiento para 2 TM de papa/3 min.	2 - 4	14	2
Tomate	Inducir un mejor cuajado de frutos. Aplicar durante la floración dirigiendo hacia los racimos florales.	2 - 4	--	10 a 20
Alcachofa	Aplicar al inicio de la formación del eje floral y después de 15 días.	2 - 3	N.D	--
Café	Para inducir floración uniforme aplicar cuando los botones florales estén hinchados o en primeras aperturas florales	2 - 4	N.D	10 a 20
Sandía	Al aplicar al inicio de la floración incrementa la producción, cuando se aplica a los frutos incrementa tamaño y calidad.	2 - 4	N.D	10 a 20
Naranja	Aplicar antes del cambio de color de los frutos para retardar maduración y uniformizar cosecha.	2 - 4	N.D	10 a 20
Cebolla	Aplicar para el alargamiento de hojas y formación de bulbos.	2	--	--
Alfalfa	Para incrementar el crecimiento y la producción aplicar a los 15 días del último corte.	2 - 4	N.D	10 a 20
Zanahoria	Aplicar 30 días antes de la cosecha. Incrementa el rendimiento.	2 - 4	N.D	10 a 20

\*PC: Período de carencia.

\*LMR: Límite máximo de residuos.

N.D: No determinado

**"MANTENGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINAS"  
"DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO"**



# AGROGIBB®

Regulador de Crecimiento de Plantas

TABLETAS SOLUBLES - ST

CAPEAGRO

CAPEAGRO

# AGROGIBB®

**Regulador de Crecimiento de Plantas**

TABLETAS SOLUBLES - ST

#### COMPOSICION QUIMICA:

##### Ingrediente Activo:

Ácido (3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihidro-3-metil-6-metileno-2-oxoperhidro-4<sup>a</sup>,7- metano-9b,3 propeno [1,2-b] furan-4-carboxílico ..... 10%  
Ingredientes Inertes ..... 90%

**Regulador de Crecimiento de Plantas**

Nº DE REGISTRO: PBUA Nº 163-SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

CAPEAGRO

Av. Benavides 2150. Of. 803  
Miraflores - Lima

#### Formulado Por:

**SHANGHAI KELINON  
AGROCHEMICAL CO., LTD**  
Hangzhou Economic and Technological  
Development Zone, Hangzhou, Zhejiang,  
China.

#### Importador y Distribuidor:

**CAPEAGRO S.A.C.**  
Av. Benavides 2150, Ofic. 803  
Miraflores - Lima  
[www.capeagro.com](http://www.capeagro.com)

Nº de Lote:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

**Contenido Neto: 10 Tabletas  
de 10 g c/u**

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE TÓXICO  
PRECAUCIÓN**

CAPEAGRO

# AGROGIBB

(Acido Giberélico)

**Regulador de Crecimiento de Plantas**

Tabletas Solubles - ST