

19 cm

23 cm

Orbitt®

GRÁNULOS DISPERSABLES EN AGUA (WG)

COMPOSICIÓN:

Ingrediente Activo	%
Polyoxin B	50.0
Aditivos	csp 100

FUNGICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

PBUA N° 235 - SENASA

INTEROC @ CUSTER

Titular del registro,
Importador y Distribuidor:
INTEROC S.A.
Av. Santa Cruz 875
Oficina 300 - Miraflores
Telf.: (511) 614-5100
Lima - Perú

Formulador:
SINOCHEM NINGBO CO. LTD.
21 Jiangxia St.
Ningbo 315000.
China.

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : **1Kg**
Fecha de Vencimiento :

**LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN**

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGA BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y NOTAALMÉDICO:

APLICACIÓN:

Este producto es ligeramente tóxico, por lo que en su manejo es necesario tener en cuenta las medidas generales de precaución para los plaguicidas, como:

Leer detenidamente la etiqueta antes de usar el producto. No comer, fumar ni beber durante la preparación de la mezcla y la aplicación.

Evitar contacto con la piel, los ojos y la ropa. Utilizar ropa de protección: botas, guantes, mascarillas y overol en la aplicación de la mezcla.

No transportar, ni almacenar junto con alimentos y medicinas de uso humano y animal.

Manipule los envases con cuidado para evitar roturas y derrames.

Evítese la contaminación de las fuentes de agua, estanques, drenajes.

Guardar en lugar fresco y seco. Mantener bajo llave, fuera del alcance de los niños.

Evite la inhalación, el contacto con los ojos, la piel o heridas abiertas. No inhale la niebla de aspersión.

En el caso de contacto, enjuague los ojos o la piel con abundante agua.

En caso de ingestión accidental, provoque el vómito y consiga ayuda médica.

Después de la aplicación lavarse las manos y el resto del cuerpo con abundante agua y jabón.

DL₅₀ oral > 5000 mg/Kg
DL₅₀ dermal > 5000 mg/Kg

ANTÍDOTO:

No existe antídoto específico. Proporcione tratamiento sintomático.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS
Llamar a **INTEROC S.A. (511) 614-5100**

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

ORBITT® se aplica de manera preventiva cuando se observan las condiciones propicias para el desarrollo del patógeno. Puede aplicarse con equipo de fumigación tractorizado.

ORBITT® es un fungicida sistémico con acción protectante que inhibe la síntesis de la quitina, necesaria para la formación de la pared celular de los hongos.

NOTAAL COMPRADOR:

“El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		LMR (ppm)	PC (días)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/Ha	Kg/200L		
Vid	“Oidium”	<i>Erysiphe necator</i>	0.10 - 0.25 (*)	-	0.30	N.D.
Alcachofa	“Oidium”	<i>Leveillula taurica</i>	0.10 - 0.15	-	0.30	N.D.
Pimiento	“Oidium”	<i>Leveillula taurica</i>	0.10 - 0.15	-	0.30	N.D.
Holantao	“Oidiosis”	<i>Erysiphe betae</i>	0.10 - 0.15	-	0.30	N.D.
Quinua	“Mildiu”	<i>Peronospora farinosa</i>	-	0.125	0.30	N.D.

PC: Periodo de carencia

N.D.: No determinado

(*) Considerar un gasto de agua para el cultivo de vid de 1500 L/Ha

LMR : Límite Máximo de Residuos



MANTÉNGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINAS

DESTRUYA EL ENVASE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO

3.45 cm