BOLSA GRANOLATE Plus 1 K (28 cm x 22.5 cm) Tira **18/09/12**

GRANOLATE plus

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Granulado (Gr)

Diazinon .....1 g/kg

Aditivos ..... 999 g/kg

Reg. N° 065-96-AG-SENASA

Titular del Registro, Formulado y Distribuido por:
FARMAGRO S.A.
Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos - Lima, PERÚ
Teléfono: 6141500 Fax: 6141517

FARMAGRO S A

MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Fabricante:
SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD.
N°23, Lane 5398, Shenzhuan Road, Songjiang District,
Shanghai.
CHINA

Fecha de Formulación
Lote:
Contenido Neto: **1kg**
Fecha de vencimiento

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

® Marca registrada de FARMAGRO S.A.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

BOLSA GRANOLATE Plus 1 K (28 cm x 22.5 cm) Retira **18/09/12**

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
Utilice ropa protectora (guantes, botas, pantalón y camisa de mangas largas, respirador y anteojos protectores, peto o delantal) durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Organofosforado
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta.
En caso de contacto con la piel y los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
En caso de ingestión accidental, inyectar 2 mg de atropina por vía intramuscular o intravenosa. Repetir la dosis cada 10 minutos si fuera necesario, hasta llegar a la atropinización. Puede complementar el tratamiento inyectando 0.5 a 1 g de PAM.
No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
Si es inhalado, trasladarse al aire fresco. Si no hay respiración, dar respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, dar oxígeno. Llamar a un médico.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, destruya este envase, y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
No utilice este envase para conservar alimentos o agua.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
No aplicar el producto cerca de las fuentes de agua. No aplique cuando las condiciones ambientales

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- **GRANOLATE PLUS,** es un insecticida del grupo de los organofosforados, actúa por contacto e ingestión.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

- **GRANOLATE PLUS** se recomienda aplicar en los primeros estadios del cultivo para protección preventiva.

PERÍODO DE REINGRESO:

- No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

- **GRANOLATE PLUS** es incompatible con productos de reacción alcalina y compuestos a base de cobre.

FITOTOXICIDAD:

- **GRANOLATE PLUS** no es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

- El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

Teléfono de Emergencia toxicológica:
CICOTOX 0 - 800 - 1- 3040

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

USOS Y DOSIFICACIONES RECOMENDADAS:

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN	PC (Días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	*Nombre Técnico*			
MAIZ	Cogollero	*Spodoptera frugiperda*	**8 a 10 Kg/ha** Su aplicación se hace colocando unos cuantos gránulos en el cogollo de las plantas directamente con la mano o con un aplicador especial, si se prefiere.	7	0,75
SORGO	Cañero	*Diatraea saccharalis*			

PC: *Periodo de Carencia (Días)*
L.M.R.: *Límite Maximo de Residuos (ppm)*