

PRECAUCIONES, MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

FINALL® 40 WP es un insecticida biológico de uso agrícola **LIGERAMENTE TÓXICO**; sin embargo, durante su manejo se recomienda tomarse las siguientes medidas de precaución:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de manipuleo, mezcla y aplicación del producto.
- Usar ropa de protección durante el manipuleo, mezcla, aplicación del producto.
- Terminada la aplicación, lavarse con abundante agua y jabón; y cambiarse de ropa.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Transportar el producto protegido en un envase adecuado.
- Conservarse el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; no reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuese con la piel lávese con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- **Antídoto:** No requiere.

NOTA AL MÉDICO

Ligeramente tóxico
DL50 oral: > 2000 mg/kg
DL50 dermal: > 1000 mg/kg
CL50 inhalatoria: > 5.0 mg/l

NOTA AL COMPRADOR

El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

CUADRO DE DOSIFICACIONES

CULTIVO	ENFERMEDAD		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	g/ha	g/litl 200 L		
ESPARRAGO	Gusano Ejército	<i>Spodoptera eridania</i>	600	250	No existen restricciones en la aplicación de FINALL 40 WP	—

LMR.: Límite Máximo de Residuos
PC.: Período de carencia

INDICATIVOS DE USO

FINALL® 40 WP es un insecticida producido por la bacteria *Bacillus thuringiensis* durante su esporulación, con acción letal para larvas de Lepidópteros en varios cultivos. **FINALL 40 WP** actúa por ingestión. Poco tiempo después de ingerirlo las larvas dejan de alimentarse, permaneciendo vivas aunque sin causar daños. La muerte de las larvas puede producirse entre las 48 y 72 horas después de la aplicación.

SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

FINALL® 40 WP se emplea mezclando con agua limpia la dosis recomendada en el cuadro de usos. Aplicar en pulverizaciones al follaje asegurándose de lograr una cobertura total, empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochila a palanca, a motor, tecnomas, parhuelas, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

- Iniciar las aplicaciones al observar los primeros signos de infestación en el cultivo (Larvas de 1ª y 2ª estadio).
- Puede hacerse una segunda aplicación a los 10 - 12 días después de la primera.
- Realizar hasta 3 aplicaciones por campaña.

COMPATIBILIDAD

FINALL® 40 WP es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común; excepto con materiales alcalinos.

FITOTOXICIDAD

No se han reportado problemas de fitotoxicidad en los cultivos por exceso de uso de este producto.

NO EXPLOSIVO NO CORROSIVO
NO INFLAMABLE

"MANTENGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES,
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINALES"



"DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE
DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO"



Finall[®] 40 WP

(*Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki*)

INSECTICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición Química:

Bacillus thuringiensis var. *Kurstaki* (con una potencia de 32,000 U.I./ mg de producto) 40.0%
Inerte 60.0%
Total 100.0%

INSECTICIDA BIOLÓGICO AGRÍCOLA



Registro PBUAN° 211 -SENASA

Contenido neto: 200 g (Bolsa de aluminio)

Titular del Registro: **SILCROP S.A.C**
Jr. Tampumachay 306
Urb. Tambo de Monterrico, Surco,
Lima-Perú
Telf: (01) 714-9029 / 714-9021 / 714-1102

Fabricado por: **IBERFOL S.L.**
Camino de la Sierra, s/n nave N°5-03350
COX Alicante-España

Importado y Distribuido por: **SILCROP S.A.C.**

N° Lote.:
F. de Form.:
F. de Venc.:
:

LIGERAMENTE TÓXICO PRECAUCIÓN