

**DEBE LEER LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

FINALL 40 WP es un insecticida biológico de uso agrícola **LIGERAMENTE TÓXICO**; sin embargo, durante su manejo se recomienda tomarse las siguientes medidas de precaución:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Transportar el producto protegido en un envase adecuado.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; no re-ensavar o depositar el contenido en otros envases.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuese con la piel, lávese con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

Teléfonos de emergencia:
EsSalud 117 (línea gratuita)
CICOTOX 0800-13040 (línea gratuita)

NOTA AL MÉDICO

- **Antídoto:** No requiere. Tratamiento sintomático
- Ligeramente tóxico: DL₅₀ oral: > 2000 mg/kg / DL₅₀ dermal: > 1000 mg/kg / CL₅₀ inhalatoria: > 5,0 mg/L

MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en el tanque de aplicación y luego inutilícelo **triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales** para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelve el envase triple lavado al centro de acopio autorizado

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrante del producto.



FINALL 40 WP

PLAGUICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

COMPOSICIÓN:

Bacillus thuringiensis var. *Kurstaki* (con una potencia de 32,000 U.I. / mg de producto)40,0%
Inerte60,0%
Total100,0%

Registro PBUA N° 211 -SENASA

Titular del Registro:
Grupo Agrotecnología del Perú S.A.C.



Formulado por:

Grupo Agrotecnología, S.L.
Polígono Industrial Puente Alto, Parcela 57
03300 Orihuela (Alicante) España
Teléfono: +34 96 673 82 32
Fax: +34 96 530 21 15
info@agrotecnologia.net

Distribuido por: Grupo Agrotecnología, S.L

Contenido: 200 g

N° Lote:

F. de Form.:

F. de Venc.:

NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FINALL 40 WP es un insecticida producido por la bacteria *Bacillus thuringiensis* durante su esporulación, con acción letal para larvas de Lepidópteros en varios cultivos. **FINALL 40 WP** actúa por ingestión. Poco tiempo después de ingerirlo, las larvas dejan de alimentarse permaneciendo vivas, aunque sin causar daños. La muerte de las larvas puede producirse entre las 48 y 72 horas después de la aplicación.

SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

FINALL 40 WP se emplea mezclando con agua limpia la dosis recomendada en el cuadro de usos. Aplicar en pulverizaciones al follaje asegurándose de lograr una cobertura total, empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochila a palanca, a motor, tecnomas, parihuelas, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	ENFERMEDAD		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	g/ha	g/cil 200L		
ESPÁRRAGO	Gusano Ejército	<i>Spodoptera eridania</i>	600	250	No existen restricciones en la aplicación de FINALL 40 WP	-

PC: Período de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Iniciar las aplicaciones al observar los primeros signos de infestación en el cultivo (Larvas de 1º y 2º estadio).
- Puede hacerse una segunda aplicación a los 10-12 días después de la primera.
- Realizar hasta 3 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

Ingresar al área tratada después de verificar que se encuentre bien seca.

COMPATIBILIDAD

FINALL 40 WP es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común; excepto con materiales alcalinos.

FITOTOXICIDAD

No se han reportado problemas de fitotoxicidad en los cultivos por exceso de uso de este producto.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN

