

PE-15/03/2012 80550553A

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: Almacenar bajo llave en ambiente seco bien ventilado y separado de la casa habitación. No almacene por períodos prolongados donde la temperatura excede los 46° C. Nunca trasvase el producto a otro envase para almacenarlo. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Durante el transporte y almacenamiento, evite hacerlo con productos alimenticios y medicinas. Durante el manipuleo, evite el contacto con la piel, ojos y no inhale el rocío de las aspersiones. No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la aplicación utilice ropa protectora, guantes, botas etc. y báñese con abundante agua y jabón después de cada aplicación. Quite la ropa contaminada diariamente y lávela antes de volverla a usar.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de sospecha de envenenamiento acudir inmediatamente al médico, mientras tanto si hay paro respiratorio proceder a dar respiración artificial y administrar oxígeno. En el caso de ingestión del producto, beber uno o dos vasos de agua e inducir vómito llevándose el dedo a la garganta. Si el paciente esta inconsciente o con convulsiones, no administrar nada por la boca ni inducir vómito hasta que lo vea el médico. En el caso de contaminación de la piel, lávese profundamente con abundante agua y jabón toda fuente de contaminación. Si se contamina los ojos lávelos profundamente con abundante agua y observar si persiste la irritación.

INDICACIONES PARA EL MÉDICO: Administrar inmediatamente atropina, 2-4 mg por vía intravenosa (en niños, una dosis menor: 0.5-2 mg según el peso), o más en presencia de síntomas graves. Según los síntomas, se debe administrar 2 mg más de atropina por vía intravenosa, cada 15 minutos. El cloruro de obidoxima (Toxogonin), el cloruro de pralidoxima (Protapam, 2-PAM) y todas las otras oximas están contraindicadas para el tratamiento de intoxicación por carbamatos. **ANTÍDOTO:** Sulfato de atropina

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN: CICOTOX (Lima) : 0800-1-3040 CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS: Después de usar el contenido del frasco, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

Titular del Registro:	Fabricado por:	Importado y distribuido por:
Bayer S.A.	Bayer S.A.	Bayer S.A.
Paseo de la República 3074	A.A. 80004	Paseo de la República 3074
Piso 10. San Isidro	Bogotá D.C. - Colombia	San Isidro, Lima - Perú
		Tel. 211-3800

Lote N°
 Fecha de Formulación:
 Fecha de Vencimiento:



INSECTICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)
 Thiodicarb, 350 g/L Ingredientes inertes, 770 g/L
 Reg. N° 212-96-AG-SENASA

¡ NO EXPLOSIVO ! ¡ NO INFLAMABLE !
¡ NO CORROSIVO !

**Contenido
 Neto: 250 ml**

® - Marca Registrada de Bayer CropScience



**MODERADAMENTE PELIGROSO
 DAÑINO**



PDF CERTIFICADO

Producto: Semevin

Fecha: Marzo 15 de 2012

Ref. Etiqueta 250 ml

País: PERÚ

Tamaño: 190 mm x 70 mm

TINTAS CMYK (4)

Cian Negro
 Magenta Amarillo

univisual2@gmail.com - univisual@cablenet.co