

SOLT-GIB®

Tabletas solubles (ST)

COMPOSICION QUIMICA

Ingrediente activo:

Acido Giberélico 125.00 g/kg.

Ingredientes Inertes 875.00 g/kg.

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRICOLA

Reg. PBUA N° 120-SENASA



TITULAR DE REGISTRO:

PINEROL ANDINA

Avenida Flora Tristán 463 Of. 201
Urbanización Santa Patricia
II Etapa La Molina. Lima-Perú.
Teléfono 348-1018 / Telefax 349-9609



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

SOLUCIONES TÉCNICAS DEL AGRO S.A.C

Av. Guillermo Dansey 2176
Lima Cercado - Perú
Telf : (01) 3368645
(01) 3368299

FORMULADO Y FABRICADO POR:

Saxon Technologies Ltd.
Trident House, Clare Road
Stanwell, Middlesex TW 19 7QU
Inglaterra

Número de lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

Contenido Neto: 80 Tabletas

LIGERAMENTE TOXICO - PRECAUCION

MANTENGASE ALEJADO DE LAS
PERSONAS, ANIMALES,
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y
MEDICINAS



DESTRUYA ESTE ENVASE
INMEDIATAMENTE DESPUES
DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE

Almacenar y transportar en lugar sombreado, seco y ventilado, en sus envases originales cerrados.

No comer, no beber ni fumar durante y después de la aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.

Evite su almacenamiento y transporte junto a productos alimenticios o medicinas de uso humano o veterinario.

PRIMEROS AUXILIOS

El Acido Giberélico es considerado como inócuo (no tóxico), pero en caso de ingestión accidental se puede proceder a inducir al vómito y consultar al médico.

Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sosten.

DL/50 del producto formulado

Aguda oral > 15000 mg/Kg.

Aguda dermal >2000 mg/Kg.

ANTÍDOTO

No hay antídoto específico

CUADRO DE DOSIFICACIONES

USO ESPECIFICO DEL PRODUCTO

CULTIVOS	Dosis Tab. X 200 L	ÉPOCA DE APLICACIÓN	U.A.C (días)	L.M.R. (ppm)
Tomate	2 a 4	Aplicar en forma dirigida a los racimos florales y frutos pequeños para inducir mayor cuajado y tamaño de frutos.	15	0.15
Papa	2 a 4	Para interrumpir la inactividad o la latencia de los tubérculos y estimular el brotamiento uniforme. Sumergir los tubérculos durante 5 minutos.	15	0.15
Vid	5 a 8	Aplicar sobre los racimos de vid al inicio de la apertura de flores.	15	0.15
Alfalfa	2 a 4	Para incrementar el crecimiento y producción, aplicar 15 días después del corte en cultivo mayor de un año.	15	0.15

UAC: Última Aplicación antes de la Cosecha (días)

LMR : Límite Máximo de Residuos (ppm)

NO EXPLOSIVO NO INFLAMABLE NO CORROSIVO

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta y es apto para su uso, siguiendo las instrucciones dadas.

INDICATIVOS DE USO

SOLTGIB es una hormona vegetal que estimula y regula el crecimiento de las plantas, induce a la floración, disminución de la caída de los frutos, regula la maduración de frutos, produce interrupción de la latencia en las semillas, tubérculos y bulbos.

PREPARACION Y APLICACION

Llenar el tanque con el volumen de agua requerida, agregar la cantidad necesaria de tabletas de **SOLTGIB** agitar y proceder a su uso total de la mezcla el mismo día.

COMPATIBILIDAD

SOLTGIB es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común.

LIGERAMENTE TOXICO - PRECAUCION

MANTENGASE ALEJADO DE LAS
PERSONAS, ANIMALES,
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y
MEDICINAS



DESTRUYA ESTE ENVASE
INMEDIATAMENTE DESPUES
DE USAR EL PRODUCTO