

Longitud Total 28.90 cm.

Longitud de Color 28.00 cm.

Longitud Lateral 27.00 cm.

09 cm

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Bazuka®

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Glifosato (isopropilamine salt) 480 g/l
Aditivos 520 g/l

Reg. PQUA N° 500 - SENASA

Titular el Registro, Importador y Distribuidor:



Tecnología Química y Comercio S.A.
Av. Separadora Industrial Mz. "E", Lote 12
Urb. Santa Raquel 2ª Etapa, Ate. Lima - Perú.
Telf.: 511 348-1103, Fax: 511 348-1020
R.U.C N° 20307150981

Fabricado y Formulado por:
Shandong Pesticide Factory
Shandong, China

Lote N°:
F. de Formulación:
F. de Vencimiento:

Contenido Neto: 1 L

NO EXPLOSIVO NO INFLAMABLE NO CORROSIVO

© Marca Registrada por Tecnología Química y Comercio S.A.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: BAZUKA® es un herbicida sistémico, no selectivo, empleado para el control post-emergente de las malezas gramíneas, cyperáceas y de hoja ancha; anuales y perennes. BAZUKA® se aplica en pulverizaciones, previa mezcla con agua. Se recomienda agregar un coadyuvante a la mezcla para favorecer la dispersión y adherencia del herbicida. Aplicar uniformemente con equipos de aspersión terrestre, provistos de boquillas de abanico. Evitar la deriva o arrastre de la solución a cultivos vecinos.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

USO ESPECÍFICO Y DOSIS:

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
NARANJO	"Cadillo" "Gramalote" "Pata de gallina"	Cenchrus echinatus Panicum purpurescens Eleusine indica	Malezas Anuales: 2- 3 L/ha	N.D.	0,2
CAÑA DE AZUCAR	"Grama china" "Totora"	Sorghum halepense Typha angustifolia		70	2,0
PALMA ACEITERA	"Kikuyo" "Pajilla"	Pennisetum clandestinum Leptochloa filiformis	Malezas Perennes: 3 - 6 L/ha	N.D.	N.D.
CAFÉ	"Grama dulce"	Cynodon dactylon		28	1,0
PALTO	"Coquito" "Grama dulce" "Yuyo"	Cyperus rotundus Cynodon dactylon Amaranthus dubius	Malezas Perennes: 3 - 6 L/ha	N.D.	0,2
MANGO	"Coquito" "Pata de gallina" "Amor seco"	Cyperus rotundus Eleusine indica Bidens pilosa		N.D.	0,2
CANALES DE IRRIGACIÓN	"Plumilla" "Coquito"	Chloris virgata Cyperus rotundus		N.A.	N.A.
BORDOS ACEQUIAS	"Avena loca" "Lengua de vaca"	Avena fatua Rumex crispus		N.A.	N.A.
PÁPRIKA	"Yuyo"	Amaranthus dubius	2 - 3 L/ha	N.D.	0,1
	"Pata de gallina" "Coquito"	Eleusine indica Cyperus rotundus	3 - 6 L/ha		

P.C.= Período de carencia, no aplica por ser un producto dirigido a la maleza/ L.M.R.= Límite máximo de residuos / N.A.= No aplica. (*) La dosis mínima es para suelos ligeros y la máxima para suelos pesados. N.D.= No determinado.

VOLUMEN DE APLICACIÓN: 200-400 L/ha dependiendo de la densidad de las malezas.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Realizar máximo una aplicación por campaña en post-emergencia temprana, considerando una campaña al año. En malezas anuales de hoja ancha y gramíneas, aplicar en estados tempranos de crecimiento. En malezas perennes de sistema radicular profundo, aplicar al inicio de la floración. También, aplicar sobre las malezas dentro y a lo largo de los canales de irrigación en períodos de limpieza o cuando no tengan carga de agua. Esperar 2 a 3 días antes de volver a utilizar el canal.

PERIODO DE REINGRESO: 12 horas.

COMPATIBILIDAD: No mezclar con herbicidas post-emergentes de contacto ni con herbicidas hormonales.

FITOTOXICIDAD: Evitar el contacto con el follaje de plantas cultivadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

