

Longitud Total 28.90 cm.

Longitud de Color 28.00 cm.

Longitud Literal 27.00 cm.

09 cm

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Peligroso si es inhalado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Útilice ropa protectora durante el manipuleo, mezcla y aplicación (guantes de goma, delantal, botas de goma, gafas, careta, gorro, máscara) y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Ácido fosfónico.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- Su ingestión accidental, produce síntomas de intoxicación como dolor de cabeza, diarrea, vómito, etc. Provocar el vómito dando de beber agua tibia con sal o introduciendo un dedo a la garganta. Hacer un lavado gástrico.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos durante 15 minutos; y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

NOTA AL MÉDICO: El tratamiento será sintomático. No existe ANTÍDOTO específico. En caso de **emergencia toxicológica** llamar a **CICOTOX** Telf.: **0 800-1-3040** (Centro de Información, Control Toxicológico y Apoyo a la Gestión Ambiental) - Atención 24 horas. **ESSALUD:** Telf.: **472-2300**

Atención al Cliente: *Tecnología Química y Comercio S.A.* Telf.: **348-1103**
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**
- Tóxico para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

© Marca Registrada por *Tecnología Química y Comercio S.A.*

Bazuka®

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Gliphosate (isopropilamine salt) 480 g/l
Aditivoscsp 1L

Reg. PQUA N° 500 - SENASA

Titular el Registro, Importador y Distribuidor:



Tecnología Química y Comercio S.A.
Av. Separadora Industrial Mz. "E", Lote 12
Urb. Santa Raquel 2ª Etapa, Ate. Lima - Perú.
Telf.: 511 348-1103, Fax: 511 348-1020
R.U.C N° 20307150981

Fabricado y Formulado por:

Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd
6TH Floor, Gaoxinjishuchuangye Centre, Shungua Road 750#, Jinan,
Shandong, China

Lote N°:
F. de Formulación:
F. de Vencimiento:

Contenido Neto: 1 L

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: **BAZUKA®** es un herbicida sistémico, no selectivo, empleado para el control post-emergente de las malezas gramíneas, cyperáceas y de hoja ancha; anuales y perennes. **BAZUKA®** se aplica en pulverizaciones, previa mezcla con agua. Se recomienda agregar un coadyuvante a la mezcla para favorecer la dispersión y adherencia del herbicida. Aplicar uniformemente con equipos de aspersión terrestre, provistos de boquillas de abanico. Evitar la deriva o arrastre de la solución a cultivos vecinos.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”
USO ESPECÍFICO Y DOSIS:

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
NARANJO	"Cadillo" "Gramalote" "Pata de gallina"	Cenchrus echinatus Panicum purpurescens Eleusine indica	Malezas Anuales: 2- 3 L/ha	N.D.	0,2
CAÑA DE AZÚCAR	"Gramma china" "Totora"	Sorghum halepense Typha angustifolia		70	2,0
PALMA ACEITERA	"Kikuyo" "Pajilla"	Pennisetum clandestinum Leptochloa filiformis		N.D.	N.D.
CAFÉ	"Gramma dulce"	Cynodon dactylon	Malezas Perennes: 3 - 6 L/ha	28	1,0
PALTO	"Coquito" "Gramma dulce" "Yuyo"	Cyperus rotundus Cynodon dactylon Amaranthus dubius		N.D.	0,2
MANGO	"Coquito" "Pata de gallina" "Amor seco"	Cyperus rotundus Eleusine indica Bidens pilosa		N.D.	0,2
CANALES DE IRRIGACIÓN	"Plumilla" "Coquito"	Chloris virgata Cyperus rotundus		N.A.	N.A.
BORDOS ACEQUIAS	"Avena loca" "Lengua de vaca"	Avena fatua Rumex crispus		N.A.	N.A.
PÁPRIKA	"Yuyo" "Pata de gallina" "Coquito"	Amaranthus dubius Eleusine indica Cyperus rotundus	2 - 3 L/ha 3 - 6 L/ha	N.D.	0,1

P.C.= Período de carencia, no aplica por ser un producto dirigido a la maleza/ L.M.R.= Límite máximo de residuos / N.A.= No aplica. (*) La dosis mínima es para suelos ligeros y la máxima para suelos pesados. N.D.= No determinado.

VOLUMEN DE APLICACIÓN: 200-400 L/ha dependiendo de la densidad de las malezas.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Realizar máximo una aplicación por campaña en post-emergencia temprana, considerando una campaña al año. En malezas anuales de hoja ancha y gramíneas, aplicar en estados tempranos de crecimiento. En malezas perennes de sistema radicular profundo, aplicar al inicio de la floración. También, aplicar sobre las malezas dentro y a lo largo de los canales de irrigación en períodos de limpieza o cuando no tengan carga de agua. Esperar 2 a 3 días antes de volver a utilizar el canal.

PERIODO DE REINGRESO: 12 horas.

COMPATIBILIDAD: No mezclar con herbicidas post-emergentes de contacto ni con herbicidas hormonales.

FITOTOXICIDAD: Evitar el contacto con el follaje de plantas cultivadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".

