

Longitud Total 28.90 cm.

Longitud de Color 28.00 cm.

Longitud Literal 27.00 cm.

09 cm

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Peligroso si es inhalado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, mezcla y aplicación (guantes de goma, delantal, botas de goma, gafas, careta, gorro, máscara) y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Ácido fosfónico.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- Su ingestión accidental, produce síntomas de intoxicación como dolor de cabeza, diarrea, vómito, etc. Provocar el vómito dando de beber agua tibia con sal o introduciendo un dedo a la garganta. Hacer un lavado gástrico.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos durante 15 minutos; y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**NOTA AL MÉDICO:** El tratamiento será sintomático. No existe ANTÍDOTO específico. En caso de **emergencia toxicológica** llamar a **CICOTOX** Telf.: **0 800-1-3040** (Centro de Información, Control Toxicológico y Apoyo a la Gestión Ambiental) - Atención 24 horas. **ESSALUD:** Telf.: **472-2300**

Atención al Cliente: **Tecnología Química y Comercio S.A. Telf.: 348-1103**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo y perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente le triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.
- MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**
- Tóxico para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

© Marca Registrada por Tecnología Química y Comercio S.A.

# Bazuka®

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Gliphosate (isopropilamine salt) ..... 480 g/l  
Aditivos .....csp 1L

Reg. PQUA N° 500 - SENASA

Titular el Registro, Importador y Distribuidor:



**Tecnología Química y Comercio S.A.**  
Av. Separadora Industrial Mz. "E", Lote 12  
Urb. Santa Raquel 2ª Etapa, Ate. Lima - Perú.  
Telf.: 511 348-1103, Fax: 511 348-1020  
R.U.C N° 20307150981

Fabricado y Formulado por:  
**Ningbo Generic Chemical Co., Ltd.**  
Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,  
Ningbo 315010, Zhejiang, China.

Lote N°:  
F. de Formulación:  
F. de Vencimiento:

Contenido Neto: 1 L

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:** **BAZUKA®** es un herbicida sistémico, no selectivo, empleado para el control post-emergente de las malezas gramíneas, cyperáceas y de hoja ancha; anuales y perennes. **BAZUKA®** se aplica en pulverizaciones, previa mezcla con agua. Se recomienda agregar un coadyuvante a la mezcla para favorecer la dispersión y adherencia del herbicida. Aplicar uniformemente con equipos de aspersión terrestre, provistos de boquillas de abanico. Evitar la deriva o arrastre de la solución a cultivos vecinos.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”  
**USO ESPECÍFICO Y DOSIS:**

| CULTIVO               | MALEZAS                                       |                                                               | DOSIS<br>L/ha                      | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|
|                       | NOMBRE COMÚN                                  | NOMBRE CIENTÍFICO                                             |                                    |                |                 |
| NARANJO               | "Cadillo"<br>"Gramalote"<br>"Pata de gallina" | Cenchrus echinatus<br>Panicum purpurescens<br>Eleusine indica | Malezas<br>Anuales:<br>2- 3 L/ha   | N.D.           | 0,2             |
| CAÑA DE AZÚCAR        | "Gramma china"<br>"Totora"                    | Sorghum halepense<br>Typha angustifolia                       |                                    | 70             | 2,0             |
| PALMA ACEITERA        | "Kikuyo"<br>"Pajilla"                         | Pennisetum clandestinum<br>Leptochloa filiformis              |                                    | N.D.           | N.D.            |
| CAFÉ                  | "Gramma dulce"                                | Cynodon dactylon                                              | Malezas<br>Perennes:<br>3 - 6 L/ha | 28             | 1,0             |
| PALTO                 | "Coquito"<br>"Gramma dulce"<br>"Yuyo"         | Cyperus rotundus<br>Cynodon dactylon<br>Amaranthus dubius     |                                    | N.D.           | 0,2             |
| MANGO                 | "Coquito"<br>"Pata de gallina"<br>"Amor seco" | Cyperus rotundus<br>Eleusine indica<br>Bidens pilosa          |                                    | N.D.           | 0,2             |
| CANALES DE IRRIGACIÓN | "Plumilla"<br>"Coquito"                       | Chloris virgata<br>Cyperus rotundus                           |                                    | N.A.           | N.A.            |
| BORDOS ACEQUIAS       | "Avena loca"<br>"Lengua de vaca"              | Avena fatua<br>Rumex crispus                                  |                                    | N.A.           | N.A.            |
| PÁPRIKA               | "Yuyo"<br>"Pata de gallina"<br>"Coquito"      | Amaranthus dubius<br>Eleusine indica<br>Cyperus rotundus      | 2 - 3 L/ha<br>3 - 6 L/ha           | N.D.           | 0,1             |

P.C.= Período de carencia, no aplica por ser un producto dirigido a la maleza/ L.M.R.= Límite máximo de residuos / N.A.= No aplica. (\*) La dosis mínima es para suelos ligeros y la máxima para suelos pesados. N.D.= No determinado.

**VOLUMEN DE APLICACIÓN:** 200-400 L/ha dependiendo de la densidad de las malezas.  
**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Realizar máximo una aplicación por campaña en post-emergencia temprana, considerando una campaña al año. En malezas anuales de hoja ancha y gramíneas, aplicar en estados tempranos de crecimiento. En malezas perennes de sistema radicular profundo, aplicar al inicio de la floración. También, aplicar sobre las malezas dentro y a lo largo de los canales de irrigación en períodos de limpieza o cuando no tengan carga de agua. Esperar 2 a 3 días antes de volver a utilizar el canal.

**PERÍODO DE REINGRESO:** 12 horas.

**COMPATIBILIDAD:** No mezclar con herbicidas post-emergentes de contacto ni con herbicidas hormonales.

**FITOTOXICIDAD:** Evitar el contacto con el follaje de plantas cultivadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".



Pantone 362 C Pantone 300 C

Reflex Bluc C Pantone 293 C