

INDICACIONES GENERALES

- **Vertimec® 084 SC**, es insecticida, su ingrediente activo abamectina tiene un amplio espectro de acción, siendo activo contra muchas especies de insectos, ácaros y nematodos, actúa principalmente por ingestión pero tiene alguna acción por contacto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- Para la preparación, adicionar la cantidad de **Vertimec® 084 SC** a utilizar en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la cantidad de agua. En caso utilice un surfactante no iónico, añádalo al último y vuelva a agitar.
- **Vertimec® 084 SC** puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre, pulverizador manual, atomizadora o equipo tractorizado, siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas (de preferencia tipo cono vacío).
- **Vertimec® 084 SC** puede ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas, sobre todo en la zona donde se encuentran los insectos a controlar.
- Para obtener un flujo de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación así como el ritmo del aplicador durante la aplicación.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	PLAGAS					
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
			(cc/ha)	cc/200 L de agua		
Papa	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	80 - 100		14	0.01
	Acaro hialino	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>		30 - 40		
Mandarina	Acaro hialino	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>		10 - 20	7	0.01
	Acaro del tostado	<i>Phyllocotrupta oleivora</i>		30 - 40		
	Minador	<i>Phyllocnistis citrella</i>		80 - 100		

P.C.: Periodo de Carencia L.M.R.: Límite Máximo de Residuos en partes por millón (ppm)

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

- En el cultivo de papa, aplicar **Vertimec® 084 SC** cuando se observen los primeros daños.
- Para evitar la aparición de resistencia, utilizar **Vertimec® 084 SC** en rotación con insecticidas de mecanismos de acción diferentes.
- Realizar una sola aplicación, si es necesario repetir 15 días después de la primera.

PERIODO DE REINGRESO

- 24 horas

COMPATIBILIDAD

- **Vertimec® 084 SC** puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas comúnmente utilizados. En caso de duda, se recomienda efectuar previamente una prueba de compatibilidad física a las dosis recomendadas.

FITOTOXICIDAD

Vertimec® 084 SC no ha causado fitotoxicidad a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**