

CLIENTE	OT FARMEX / SUMMIT AGRO	TIPO DE IMPRESIÓN	DESCRIPCIÓN
		OFFSET	ETIQ. ADH TAKUMI x 500g T/R
FORMATO	ABIERTO 16 X 20 cm CERRADO	COLOR TIRA	COLOR RETIRA
MATERIAL	ADHESIVO DE SEGURIDAD ARCLAD (LITHO 80-SD)	C  M  Y  K 	Y  K 
CANTIDAD	0000 unid. (TIRA Y RETIRA)	ACABADOS BARNIZADO UV BRILLANTE - TROQUELADO SEMI CORTE - CORTE RECTO	

Es responsabilidad del cliente aprobar el formato, dimensiones, textos y colores.

16.00 cm

16.00 cm

17.00 cm

3.00 cm

← línea de semicorte (troquel)

ZONA DE TROQUELADO

Takumi®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS DISPERSABLES - WG

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Flubendiamide.....200 g/kg

Aditivos.....800 g/kg

Reg. PQUA N° 491 - SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:

SummitAgro

SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA, SUCURSAL PERU

Calles Coronel Andrés Reyes N° 360 Of. 401-A San Isidro, Lima 27 Perú.

Telf.: (511) 444-3096

FORMULADO POR:

NIHON NOHYAKU CO., LTD

1-2-5 Nihonbashi Chuo-ku, Tokyo 103-8236. Japon

Teléfono: 81-3-32743382 / Fax: 81-3-32815462

CONTENIDO NETO: 500 g

Número de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

® **Marca Registrada**

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- “Causa irritación moderada a los ojos”.
- “Evite el contacto con los ojos”.
- “Evite el contacto con la piel y la ropa”.
- “Use lentes integrales de protección”.
- “No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación”.
- “Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Benzenodicarbonamidas o diamida de ácido ftálico.
- **Indicaciones Generales:**
- Evite el contacto con la piel, ojos y vestimenta. Cambiarse la ropa contaminada. En caso de malestar. Solicitar atención médica, mostrar al médico el envase, la etiqueta y/o Hoja de Seguridad.
- **Contacto con los ojos:** Mantener los párpados abiertos y enjuagar lenta y generosamente con agua en forma continua por 15-20 minutos. Si fuese posible, remueva los lentes de contacto después de los 5 primeros minutos, luego continúe enjuagándose los ojos. Buscar atención médica.
- **Contacto con la piel:** Remover la ropa contaminada y los zapatos de inmediato. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón por al menos 15 minutos. Buscar atención médica de inmediato y muestrele la etiqueta de ser posible.
- **Ingestión:** Consulte de inmediato al médico o a un centro toxicológico. Enjuague la boca y dar de beber agua en pequeños sorbos. No induzca el vómito al menos que haya consultado con un centro de control de envenenamiento o un doctor. No suministre nada por la boca, cuando la persona esté inconsciente. No deje al paciente sin atención.
- **Inhalación:** Llevar al paciente al aire fresco. Si la persona no está respirando, suministre respiración artificial, preferiblemente boca a boca. Consulte al médico o a un centro toxicológico de inmediato y muestrele la etiqueta de ser posible.
- **NOTA AL MÉDICO:** No hay antídoto específico.
- **TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS**
CICOTOX: 0800-13040 ó ESSALUD: 411-8000 (anexo 4)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC días	LMR ppm
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/ha	g/200 L		
Espárrago	“Gusano defoliador”	<i>Capitarsia decolora</i>	0.2 - 0.25	-	7	0.01
	“Gusano perforador grande de la bellota”	<i>Heliothis virescens</i>	0.25 - 0.30	-	7	0.01
	“Caballada (gusano ejercito)”	<i>Spodoptera eridania</i>	0.2 - 0.25	-	7	0.01
Páprika	“Polilla (gusano de fruta)”	<i>Symmetrischema capsicum</i>	0.15 - 0.2	-	1	0.2
Algodón	“Gusano menor de la hoja del algodónero”	<i>Anomis texana</i>	0.1 - 0.15	50-75	28	0.01
Tomate	“Barrenador de frutos y guías”	<i>Diaphania nitidalis</i>	-	50-75	1	0.6
Palto	“Gusano medidor”	<i>Sabulodes aegrotata</i>	-	50-75	30	0.01
Brócoli	“Polilla del dorso de diamante”	<i>Plutella xylostela</i>	0.15 - 0.175*	75 - 87.5	1	0.01
Maíz	“Gusano cogollero”	<i>Spodoptera frugiperda</i>	-	100-125	28	0.01

LMR: Límite máximo de residuos

PC: Periodo de carencia

16.00 cm

N° DOCUMENTO: _____	CÓDIGO: _____	VERSIÓN: _____	VIGENCIA: ____ ____
---------------------	---------------	----------------	---------------------

DENOMINACIÓN:	ETIQ. ADH TAKUMI x 500g T/R (SUMMIT AGRO)	APROBADO POR:	OBSERVACIONES:
PROVEEDOR:	ESPEJOS GRAF S.A.C.	SELLO	CAMBIOS REALIZADOS
MATERIAL:	ADHESIVO DE SEGURIDAD ARCLAD (LITHO 80-SD)		1. Nuevo
N° DE COLORES:	4 COLORES:		2. Cambios
	 NEGRO  CYAN  MAGENTA  YELLOW  BARNIZ UV BRILLANTE		
USO:	BOLSA TRILAMINDA		