

ZONA DE TROQUELADO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Takumi®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN

Flubendiamide..... 200 g/kg

Aditivos..... c.s.p.1kg

Reg. PQUA N° 491 - SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:



SUMMIT AGRO

SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA, SUCURSAL PERU

Calle Coronel Andrés Reyes N° 360 Of. 401-A San Isidro, Lima - Perú.

Telf.: (511) 444-3096

FORMULADO POR:

NIHON NOHYAKU CO., LTD

1-2-5 Nihonbashi Chuo-ku, Tokyo 103-8236, Japon

Teléfono: 81-3-32743382 / Fax: 81-3-32815462

Fecha de Formulación :

N° de Lote :

Contenido neto : **500 g**

Fecha de vencimiento :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

® Marca Registrada



MODERADAMENTE PELIGROSO

DAÑINO

ZONA DE TROQUELADO

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- "Causa irritación moderada a los ojos".
- "Evite el contacto con los ojos".
- "Evite el contacto con la piel y la ropa".
- "Use lentes integrales de protección".
- "No coma, no bebá ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación".
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Benzenodiacarbonamidas o diamida de ácido ftálico.
- Indicaciones Generales:**
 - Evite el contacto con la piel, ojos y vestimenta. Cambiarse la ropa contaminada.
 - En caso de malestar. Solicitar atención médica, mostrar al médico el envase, la etiqueta y/o Hoja de Seguridad.
 - **Contacto con los ojos:** Mantener los párpados abiertos y enjuagar lenta y generosamente con agua en forma continua por 15-20 minutos. Si fuese posible, remueve los lentes de contacto después de los primeros minutos, luego continúe enjuagándose los ojos.
 - Buscar atención médica.
 - **Contacto con la piel:** Remover la ropa contaminada y los zapatos de inmediato. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón por al menos 15 minutos. Buscar atención médica de inmediato y muestrele la etiqueta de ser posible.
 - **Ingestión:** Consulte de inmediato al médico o a un centro toxicológico. Enjuague la boca y dar de beber agua en pequeños sorbos. No induzca el vómito al menos que haya consultado con un centro de control de envenenamiento o un doctor. No suministre nada por la boca cuando la persona esté inconsciente. No deje al paciente sin alimento.
 - **Inhalación:** Llevar al paciente al aire fresco. Si la persona no está respirando, suministrar respiración artificial, preferiblemente boca a boca. Consulte al médico o a un centro toxicológico de inmediato y muestrele la etiqueta de ser posible.
- **NOTA AL MÉDICO:** No hay antídoto específico.
- **TÉLEFONOS DE EMERGENCIA:**
SAMU: 106
SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA, SUCURSAL PERU: (511) 444-3096
CICOTOX: (511) 619-7000 IP 4836-4837, Línea directa: 956740869

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contamine fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INDICACIONES DE USO Y MANEJO

TAKUMI® pertenece a una familia de insecticidas con un innovador modo de acción que afecta la función propia de los músculos de los insectos actuando sobre los receptores de la ryanodina. El principal modo de acción es por vía oral o por contacto con la piel.

TAKUMI® se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar. Aplique con mochila manual o a motor.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

TAKUMI® debe aplicarse cuando se note la presencia de las primeras larvas del insecto, sobre los brotes y foliaje en el cultivo de espárrago.

Se recomienda 1 aplicación/campaña.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada con el producto hasta 24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a la dosis recomendada en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD

TAKUMI® no es compatible con formulaciones líquidas de sulfuro de calcio.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenidas en estos envases, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/ha	Kg/200L		
Espárrago	"Gusano defoliador"	<i>Copitarsia decolora</i>	0.25 - 0.30	-	7	0.01
	"Gusano perforador grande de la bellota"	<i>Heliothis virescens</i>	0.25 - 0.30	-	7	0.01
	"Caballada (gusano ejercito)"	<i>Spodoptera eridania</i>	0.25 - 0.30	-	7	0.01
Páprika	"Pollita (gusano de fruta)"	<i>Symmetrischema capsicum</i>	0.15 - 0.20	-	1	0.2
Algodón	"Gusano menor de la hoja del algodónero"	<i>Anomis texana</i>	0.10 - 0.15	0.05 - 0.075	28	0.01
Tomate	"Barrenador de frutos y guías"	<i>Diaphania nitidalis</i>	-	0.05 - 0.075	1	0.6
Palto	"Gusano medidor"	<i>Sabulodes aegrotata</i>	-	0.05 - 0.075	30	0.01
Brócoli	"Pollita del dorso de diamante"	<i>Plutella xylostella</i>	0.15 - 0.175*	0.075 - 0.0875	1	0.01
Maíz	"Gusano cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.125 - 0.150	-	28	0.01
Pimiento	"Gusano perforador grande de la bellota"	<i>Heliothis virescens</i>	-	0.1 - 0.15	1	0.2
Alcachofa	"Gusano perforador grande de la bellota"	<i>Heliothis virescens</i>	0.3 - 0.45*	0.1 - 0.15	28	0.01

L.M.R.: Límite máximo de residuos
* Gasto de agua: 600 L/ha

P.C.: Periodo de carencia