

18.00 cm

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**Corbat<sup>®</sup>****PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA****FUNGICIDA AGRÍCOLA****POLVO MOJABLE (WP)****COMPOSICIÓN:**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Dimethomorph ..... | 90g/kg        |
| Mancozeb .....     | 600 g/kg      |
| Aditivos .....     | c.s.p... 1 kg |

**Reg. PQUA N° 617-SENASA**Titular del Registro: **FARMEX S.A.**

Formulado y Distribuido por:



Calle Dean Valdivia N° 148, Piso 7  
San Isidro, Lima 27 - PERU  
Teléfono: (01) 630-6400.  
www.farmex.com.pe

**CONTENIDO NETO: 1 kg**

N° de Lote:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO****NO INFLAMABLE****NO EXPLOSIVO**

© Marca registrada de Farmex S.A.

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de reentrada (reingreso), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No almacenar en casas de habitación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: morfolinas y ditiocarbamatos.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada vía oral a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, levantar los párpados y lavarlos con abundante agua por 15 a 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados, lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a una zona ventilada, brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: no tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.
- **TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU 106, FARMEX S.A.: (01) 630-6400, CISPROQUIM: 080-050-847.**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**CORBAT<sup>®</sup>** es un fungicida con actividad de contacto, superficial, protectante, sistémico, curativa y antiesporulante. **CORBAT<sup>®</sup>** se aplica con equipos de aspersión manuales, a motor o montados sobre el tractor previamente calibrados. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO | ENFERMEDAD   |                               | DOSIS     |       | PC (días) | LMR (ppm)       |
|---------|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------|
|         | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO             | kg/cil    | kg/ha |           |                 |
| CEBOLLA | Mildiu       | <i>Peronospora destructor</i> | 1.0 - 1.5 | -     | 7         | *0.6<br>**1.5   |
| PAPA    | Rancha       | <i>Phytophthora infestans</i> | -         | 2.0   | 14        | *0.05<br>**0.02 |
| VID     | Mildiu       | <i>Plasmopara viticola</i>    | 0.5       | -     | 40        | *3<br>**1.5     |

PC: Período de carencia. LMR: Límite máximo de residuos. \*Dimethomorph, \*\*Mancozeb.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN.** Realizar máximo 2 aplicaciones por campaña/año, con un intervalo mínimo de 14 días, cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones climáticas favorezcan su desarrollo.

**PERÍODO DE REINGRESO.** No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

**COMPATIBILIDAD.** Es compatible con la mayoría de plaguicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción muy alcalina (pH > 9), además de ser incompatible con agentes oxidantes y ácidos. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

**FITOTOXICIDAD.** Se recomienda no aplicar **CORBAT<sup>®</sup>** en cebolla blanca o amarilla 30 días antes de la cosecha para evitar la presencia de un ligero manchado azul en las catáfilas de los bulbos. **CORBAT<sup>®</sup>** no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado en los cultivos y a las dosis recomendadas. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de uso.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



Versión 01

22.00 cm

3.30 cm

18.00 cm

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**Corbat<sup>®</sup>****PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA****FUNGICIDA AGRÍCOLA****POLVO MOJABLE (WP)****COMPOSICIÓN:**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Dimethomorph ..... | 90g/kg        |
| Mancozeb .....     | 600 g/kg      |
| Aditivos .....     | c.s.p... 1 kg |

**Reg. PQUA N° 617-SENASA**Titular del Registro: **FARMEX S.A.****Formulado por:****NANJING ESSENCE FINE CHEMICAL CO., LTD.**

9th Floor, N° 58, Nanhu Road, Nanjing

Nanjing, 210017 – China.

Teléf.: +86 (25) 86518999.

**Importado y Distribuido por:**

Calle Dean Valdivia N° 148, Piso 7  
San Isidro, Lima 27 - PERÚ  
Teléfono: (01) 630-6400.  
www.farmex.com.pe

**CONTENIDO NETO: 1 kg**

N° de Lote:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO****NO INFLAMABLE****NO EXPLOSIVO**

© Marca registrada de Farmex S.A.

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de reentrada (reingreso), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No almacenar en casas de habitación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: morfolinás y ditiocarbamatos.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada vía oral a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, levantar los párpados y lavarlos con abundante agua por 15 a 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados, lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a una zona ventilada, brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: no tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.
- **TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU 106, FARMEX S.A.: (01) 630-6400, CISPROQUIM: 080-050-847.**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**CORBAT<sup>®</sup>** es un fungicida con actividad de contacto, superficial, protectante, sistémico, curativa y antiesporulante. **CORBAT<sup>®</sup>** se aplica con equipos de aspersión manuales, a motor o montados sobre el tractor previamente calibrados. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO | ENFERMEDAD   |                               | DOSIS     |       | PC (días) | LMR (ppm)       |
|---------|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------|
|         | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO             | kg/cil    | kg/ha |           |                 |
| CEBOLLA | Mildiu       | <i>Peronospora destructor</i> | 1.0 - 1.5 | -     | 7         | *0.6<br>**1.5   |
| PAPA    | Rancha       | <i>Phytophthora infestans</i> | -         | 2.0   | 14        | *0.05<br>**0.02 |
| VID     | Mildiu       | <i>Plasmopara viticola</i>    | 0.5       | -     | 40        | *3<br>**1.5     |

PC: Período de carencia. LMR: Límite máximo de residuos. \*Dimethomorph, \*\*Mancozeb.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN.** Realizar máximo 2 aplicaciones por campaña/año, con un intervalo mínimo de 14 días, cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones climáticas favorezcan su desarrollo.

**PERÍODO DE REINGRESO.** No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

**COMPATIBILIDAD.** Es compatible con la mayoría de plaguicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción muy alcalina (pH > 9), además de ser incompatible con agentes oxidantes y ácidos. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

**FITOTOXICIDAD.** Se recomienda no aplicar **CORBAT<sup>®</sup>** en cebolla blanca o amarilla 30 días antes de la cosecha para evitar la presencia de un ligero manchado azul en las catáfilas de los bulbos. **CORBAT<sup>®</sup>** no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado en los cultivos y a las dosis recomendadas. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de uso.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



18.00 cm

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**Corbat<sup>®</sup>****PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA****FUNGICIDA AGRÍCOLA****POLVO MOJABLE (WP)****COMPOSICIÓN:**

Dimethomorph ..... 90g/kg  
 Mancozeb ..... 600 g/kg  
 Aditivos ..... c.s.p... 1 kg

**Reg. PQUA N° 617-SENASA**Titular del Registro: **FARMEX S.A.****Formulado por:**

**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**  
 Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,  
 Ningbo, China. Código Postal: Zhejiang, 315010.  
 Teléf.: + 86-574-87301088.

**Importado y Distribuido por:**

Calle Dean Valdivia N° 148, Piso 7  
 San Isidro, Lima 27 - PERÚ  
 Teléfono: (01) 630-6400.  
 www.farmex.com.pe

**CONTENIDO NETO: 1 kg**

N° de Lote:  
 Fecha de Formulación:  
 Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO****NO INFLAMABLE****NO EXPLOSIVO**

© Marca registrada de Farmex S.A.

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de reentrada (reingreso), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No almacenar en casas de habitación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: morfollinas y ditiocarbamatos.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada vía oral a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, levantar los párpados y lavarlos con abundante agua por 15 a 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados, lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a una zona ventilada, brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: no tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.
- **TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU 106, FARMEX S.A.: (01) 630-6400, CISPROQUIM: 080-050-847.**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**CORBAT<sup>®</sup>** es un fungicida con actividad de contacto, superficial, protectante, sistémico, curativa y antiesporulante. **CORBAT<sup>®</sup>** se aplica con equipos de aspersión manuales, a motor o montados sobre el tractor previamente calibrados. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO | ENFERMEDAD   |                               | DOSIS     |       | PC (días) | LMR (ppm)       |
|---------|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------|
|         | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO             | kg/cil    | kg/ha |           |                 |
| CEBOLLA | Mildiu       | <i>Peronospora destructor</i> | 1.0 - 1.5 | -     | 7         | *0.6<br>**1.5   |
| PAPA    | Rancha       | <i>Phytophthora infestans</i> | -         | 2.0   | 14        | *0.05<br>**0.02 |
| VID     | Mildiu       | <i>Plasmopara viticola</i>    | 0.5       | -     | 40        | *3<br>**1.5     |

PC: Período de carencia. LMR: Límite máximo de residuos. \*Dimethomorph, \*\*Mancozeb.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN.** Realizar máximo 2 aplicaciones por campaña/año, con un intervalo mínimo de 14 días, cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones climáticas favorezcan su desarrollo.

**PERÍODO DE REINGRESO.** No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

**COMPATIBILIDAD.** Es compatible con la mayoría de plaguicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción muy alcalina (pH > 9), además de ser incompatible con agentes oxidantes y ácidos. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

**FITOTOXICIDAD.** Se recomienda no aplicar **CORBAT<sup>®</sup>** en cebolla blanca o amarilla 30 días antes de la cosecha para evitar la presencia de un ligero manchado azul en las catáfilas de los bulbos. **CORBAT<sup>®</sup>** no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado en los cultivos y a las dosis recomendadas. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de uso.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



Versión 01

22.00 cm

3.30 cm

18.00 cm

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**Corbat®****PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA****FUNGICIDA AGRÍCOLA****POLVO MOJABLE (WP)****COMPOSICIÓN:**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Dimethomorph ..... | 90g/kg        |
| Mancozeb .....     | 600 g/kg      |
| Aditivos .....     | c.s.p... 1 kg |

**Reg. PQUA N° 617-SENASA**Titular del Registro: **FARMEX S.A.****Formulado por:**

**NINGBO SYNAGROCHEM CO. LTD.**  
N° 757 Room 1801, Rili Middle  
Road, Ningbo, 315199, China.  
Teléf.: +86-574-8309 9905.

**Importado y Distribuido por:**

Calle Dean Valdivia N° 148, Piso 7  
San Isidro, Lima 27 - PERÚ  
Teléfono: (01) 630-6400.  
www.farmex.com.pe

**CONTENIDO NETO: 1 kg**

N° de Lote:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO**

© Marca registrada de Farmex S.A.

**NO INFLAMABLE****NO EXPLOSIVO****LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de reentrada (reingreso), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No almacenar en casas de habitación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: morfollinas y ditiocarbamatos.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada vía oral a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, levantar los párpados y lavarlos con abundante agua por 15 a 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados, lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a una zona ventilada, brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: no tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.
- **TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU 106, FARMEX S.A.: (01) 630-6400, CISPROQUIM: 080-050-847.**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**CORBAT®** es un fungicida con actividad de contacto, superficial, protectante, sistémico, curativa y antiesporulante. **CORBAT®** se aplica con equipos de aspersión manuales, a motor o montados sobre el tractor previamente calibrados. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO | ENFERMEDAD   |                               | DOSIS     |       | PC (días) | LMR (ppm)       |
|---------|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------|
|         | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO             | kg/cil    | kg/ha |           |                 |
| CEBOLLA | Mildiu       | <i>Peronospora destructor</i> | 1.0 - 1.5 | -     | 7         | *0.6<br>**1.5   |
| PAPA    | Rancha       | <i>Phytophthora infestans</i> | -         | 2.0   | 14        | *0.05<br>**0.02 |
| VID     | Mildiu       | <i>Plasmopara viticola</i>    | 0.5       | -     | 40        | *3<br>**1.5     |

PC: Período de carencia. LMR: Límite máximo de residuos. \*Dimethomorph, \*\*Mancozeb.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN.** Realizar máximo 2 aplicaciones por campaña/año, con un intervalo mínimo de 14 días, cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones climáticas favorezcan su desarrollo.

**PERÍODO DE REINGRESO.** No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

**COMPATIBILIDAD.** Es compatible con la mayoría de plaguicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción muy alcalina (pH > 9), además de ser incompatible con agentes oxidantes y ácidos. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

**FITOTOXICIDAD.** Se recomienda no aplicar **CORBAT®** en cebolla blanca o amarilla 30 días antes de la cosecha para evitar la presencia de un ligero manchado azul en las catáfilas de los bulbos. **CORBAT®** no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado en los cultivos y a las dosis recomendadas. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de uso.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



Versión 01

22.00 cm

3.30 cm

18.00 cm

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**Corbat®****PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA****FUNGICIDA AGRÍCOLA****POLVO MOJABLE (WP)****COMPOSICIÓN:**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Dimethomorph ..... | 90g/kg        |
| Mancozeb .....     | 600 g/kg      |
| Aditivos .....     | c.s.p... 1 kg |

**Reg. PQUA N° 617-SENASA**Titular del Registro: **FARMEX S.A.****Formulado por:**

**SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD.**  
N° 23, Lane 5398, Shenzhuan Road,  
Songjiang District, Shanghai, China.

**Importado y Distribuido por:**

Calle Dean Valdivia N° 148, Piso 7  
San Isidro, Lima 27 - PERÚ  
Teléfono: (01) 630-6400.  
www.farmex.com.pe

**CONTENIDO NETO: 1 kg**

N° de Lote:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO****NO INFLAMABLE****NO EXPLOSIVO**

© Marca registrada de Farmex S.A.

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de reentrada (reingreso), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No almacenar en casas de habitación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: morfolinás y ditiocarbamatos.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada vía oral a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, levantar los párpados y lavarlos con abundante agua por 15 a 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados, lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a una zona ventilada, brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: no tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.
- **TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU 106, FARMEX S.A.: (01) 630-6400, CISPROQUIM: 080-050-847.**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**CORBAT®** es un fungicida con actividad de contacto, superficial, protectante, sistémico, curativa y antiesporulante. **CORBAT®** se aplica con equipos de aspersión manuales, a motor o montados sobre el tractor previamente calibrados. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO | ENFERMEDAD   |                               | DOSIS     |       | PC (días) | LMR (ppm)       |
|---------|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------|
|         | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO             | kg/cil    | kg/ha |           |                 |
| CEBOLLA | Mildiu       | <i>Peronospora destructor</i> | 1.0 - 1.5 | -     | 7         | *0.6<br>**1.5   |
| PAPA    | Rancha       | <i>Phytophthora infestans</i> | -         | 2.0   | 14        | *0.05<br>**0.02 |
| VID     | Mildiu       | <i>Plasmopara viticola</i>    | 0.5       | -     | 40        | *3<br>**1.5     |

PC: Período de carencia. LMR: Límite máximo de residuos. \*Dimethomorph, \*\*Mancozeb.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN.** Realizar máximo 2 aplicaciones por campaña/año, con un intervalo mínimo de 14 días, cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones climáticas favorezcan su desarrollo.

**PERÍODO DE REINGRESO.** No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

**COMPATIBILIDAD.** Es compatible con la mayoría de plaguicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción muy alcalina (pH > 9), además de ser incompatible con agentes oxidantes y ácidos. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

**FITOTOXICIDAD.** Se recomienda no aplicar **CORBAT®** en cebolla blanca o amarilla 30 días antes de la cosecha para evitar la presencia de un ligero manchado azul en las catáfilas de los bulbos. **CORBAT®** no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado en los cultivos y a las dosis recomendadas. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de uso.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



22.00 cm

3.30 cm