

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

# CORBAT

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE – WP

## COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Dimethomorph.....	90 g/Kg
Mancozeb .....	600 g/Kg
Aditivos .....	c.s.p... 1.0 Kg

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar este producto en su envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

### PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: morfollinas y ditiocarbamatos.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente a un Centro Médico, mostrar la etiqueta o envase original.
- Este producto no tiene antidoto específico, el tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada vía oral a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, levantar los párpados y lavarlos con abundante agua por 15 a 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados, lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a una zona ventilada, brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Teléfonos de emergencia: ESSALUD en Línea (opción 4), 0801-10200 (línea gratuita), CICOTOX 0800-13040 (línea gratuita), CISPROQUIM 0800-50-847.

### CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
  - No reutilizar los envases ni enterrarlos.
  - No disponer los envases con residuos municipales.
- ### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para organismos acuáticos.
  - No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
  - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
  - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
  - Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
  - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
  - El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
  - En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CORBAT es un fungicida de contacto, superficial, protectante, sistémico, curativo y antiesporulante.

CORBAT se aplica con equipos de aspersión manuales, a motor o montados sobre el tractor previamente calibrados. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

### CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

### CUADRO DE USOS:

Cultivo	Enfermedad		Dosis (Kg/cil.)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Cebolla	Mildió	<i>Peronospora destructor</i>	1.0 – 1.5	7	Mancozeb 1.0 Dimethomorph: 0.15

PC: Período de Carencia, LMR: Límite Máximo de Residuos

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar máximo 2 aplicaciones por campaña/año, cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones climáticas favorezcan su desarrollo.

### PERÍODO DE REINGRESO:

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

### COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de plaguicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción muy alcalina (pH > 9), además de ser incompatible con agentes oxidantes y ácidos. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

### FITOTOXICIDAD:

CORBAT no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Reg. N°

Titular del Registro: **FARMEX S.A.**

Fabricado y formulado por:

**SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD.**

No. 23, Lane 5398, Shenzhuan Road,  
Songjiang District, Shanghai, China.

Fecha de Formulación:

No. de Lote:

Contenido neto: 1 Kg

Fecha de Vencimiento:



Distribuido por:  
**FARMEX S.A.**

Calle Dean Valdivia N° 148, Piso 7, San Isidro. Lima, Perú.  
Teléfono: 511-6306400

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO – CUIDADO

