

0.5 cm

18.0 cm

0.5 cm

línea
de semicorte
(troquel)

0.5 cm

22.0 cm

3.3 cm

0.5 cm

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Corbat®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Dimethomorph 90 g/kg
Mancozeb 600 g/kg
Aditivos C.S.p. 1 kg

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar este producto en su envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora, guantes, botas y máscara durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: morfollinas y ditiocarbamatos.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muestre la etiqueta.
- Este producto no tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada vía oral a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, levantar los párpados y lavarlos con abundante agua por 15 a 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados, lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a una zona ventilada, brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Teléfonos de Emergencia: CISPQUIM: 080-050-847, FARMEX S.A. (01) 630-6400.
- Antídoto: No tiene antídoto específico el tratamiento es sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido inutilicelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CORBAT® es un fungicida de contacto, superficial, protectante, sistémico, curativo y antiesporulante.

CORBAT® se aplica con equipos de aspersión manuales, a motor o montados sobre el tractor previamente calibrados. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/cil.	kg/ha		
CEBOLLA	Mildió	<i>Peronospora destructor</i>	1.0 - 1.5	-	7	0.6 1.5
PAPA	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	-	2.0	14	0.05 0.2
VID	Mildió	<i>Plasmopara viticola</i>	0.5	-	40	3 1.5

P.C.: Período de Carencia. L.M.R.: Límite Máximo de Residuos. *dimethomorph, **mancozeb

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar máximo 2 aplicaciones por campaña/año, con un intervalo mínimo de 14 días, cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones climáticas favorezcan su desarrollo.

PERÍODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción muy alcalina (pH > 9), además de ser incompatible con agentes oxidantes y ácidos. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD

CORBAT® no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Titular del Registro: FARMEX S.A.
Formulado y distribuido por:



Farmex
Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERU
Teléfono: (01) 630-6400.
www.farmex.com.pe

Reg. PQUA N° 617-SENASA

CONTENIDO NETO: 1 kg

NO CORROSIVO

©Marca registrada de Farmex S.A.

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

