

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Peligroso si es inhalado. Evitar respirar el vapor o la aspersión.
- El producto causa irritación moderada a los ojos. Evitar el contacto con los ojos.
- No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Después de usar el producto cambiarse, bañarse con abundante agua y jabón, y lavar la ropa contaminada.
- Utilizar el equipo de protección durante el manipuleo, aplicación y para ingresar a área tratada dentro de las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Fenilpirazol

- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar a la víctima al médico y mostrarle esta etiqueta.
 - En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua y si el contacto fue con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
 - En caso de inhalación: llevar a la persona a un lugar abierto y proporcionarle aire fresco. Despejar las ropas alrededor del cuello y el pecho. Brindar respiración artificial en caso de ser necesario.
 - En caso de ingestión, solicitar atención médica inmediata. Si la persona puede tragar, dar a beber un vaso con agua. No administrar leche o alcohol o sustancias grasas, no inducir al vómito. No administrar nada a una persona inconsciente.
- Nota al médico:** No se conoce antídoto específico, el tratamiento es sintomático. El fenobarbital o diazepam pueden ser útiles para controlar las convulsiones inducidas por el Fipronil.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 08001-3040(gratuito) / 328-7398
Infosalud 0800-10828 (emergencia 24 horas)
ESSALUD EN LINEA: 411-8000 CÍSPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en el mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No mezclar con residuos municipales.
- Realizar Obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos, no aplicar en épocas de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos, envases vacíos, restos de aplicación.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

SHARFIP 20 SC

INSECTICIDA AGRICOLA

SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

Composición Química:

Fipronil..... 200 g/L
 Aditivos csp..... 1 L

Reg. PQUA N° 618 - SENASA

Titular del Registro:
SHARDA PERU SAC
 Teléfono: 222-2695

Importado y distribuido por:
PERU PRODUCTOS AGRICOLAS S.A.C.
 Av Nicolás de Arriola 2374,
 Urb. El Pino, San Luis, Lima
 Telf (511) 547-0638

Formulado por:

Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd
 Dominic Holm, 29th Road,
 Bandra (W), Mumbai - 400 050 - INDIA

Contenido Neto: 1 L

Lote N°:
 Fecha de Form.:
 Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

SHARFIP 20 SC es un insecticida fenilpirazol de acción sistémica y de amplio espectro; que actúa por contacto e ingestión. Presenta buen efecto residual sobre insectos del follaje.

SHARFIP 20 SC se emplea diluido en agua; preparar una pre mezcla de acuerdo a la dosis recomendada, en un tercio del volumen de agua a utilizar. Agitar bien y completar el volumen de agua de aplicación.

SHARFIP 20 SC puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochila a palanca o motor, parihuelas, etc.). Antes de Iniciar la aplicación asegúrese que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y correctamente calibrado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	ml/cil	ml/ha		
Espárrago	"Trips"	<i>Thrips tabaci</i>	100 - 200	200 - 400	14	0.01

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se deberá evaluar la incidencia de la plaga y las condiciones óptimas de su desarrollo, para proceder a la aplicación de **SHARFIP 20 SC**. También dependerá de la etapa del desarrollo del cultivo y la época de siembra. Se recomienda realizar 2 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

SHARFIP 20 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común.

FITOTOXICIDAD:

SHARFIP 20 SC no es fitotóxico a las dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

