

18 cm

SANTIMEC®

ACARICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Abamectin	12 g/L
Pyridaben	90 g/L
Solvesso 150	778 g/L
Aditivos	csp 1L

PQA N° 615 - SENASA

INTEROC® CUSTER

**Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:**
INTEROC S.A.

Av. Santa Cruz 875
Oficina 300 - Miraflores
Telf.: (511) 614-5100
Lima - Perú

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : 250 ml
Fecha de Vencimiento :

Formulador:
NINGBO GENERIC
CHEMICAL Co., LTD
Room 10-6, Shidai Square, No. 8,
Lengjing Street, Ningbo 315010
Telf.: +86 574 87301088
Zhejiang - China

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

**“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Utilice ropa protectora durante la manipulación, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación.
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve urgente al paciente al centro médico más cercano y muéstrele esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS
CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita) o ESSALUD: 0801-1-0200 (Línea gratuita) o
CIPROSQUIM 080-050847.

Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)	
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/cil de 200L	%		(1)	(2)
Mandarina	“Arañita roja”	<i>Panonychus citri</i>	0.2 - 0.25	—	7	0.01 ⁽¹⁾	0.5 ⁽²⁾
Fresa	“Arañita roja”	<i>Tetranychus urticae</i>	0.15 - 0.20	—	7	0.02 ⁽¹⁾	0.05 ⁽²⁾
Palto	“Ácaro”	<i>Oligonychus punicae</i>	0.2	—	15	0.01 ⁽¹⁾	0.5 ⁽²⁾
Vid	“Ácaro”	<i>Colomerus vitis</i>	0.1 - 0.15	0.05 - 0.075	28	0.01 ⁽¹⁾	0.5 ⁽²⁾

PC: Periodo de Carenia
(1) Abamectin, (2) Pyridaben

LMR: Limite Máximo de Residuos

8 cm

1,2 cm

