


**LEA LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente. Lleve al paciente al médico y muéstrelle copia de esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.



TELÉFONO PARA EMERGENCIAS
SAMU: 106
INTEROC S.A. (511) 614-5100

PE-SANTI-V01-19

SANTIMEC®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

ABAMECTIN 12 g/L
PYRIDABEN 90 g/L
SOLVOSO 150 778 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 615 - SENASA

@INTEROC

Pasión por la innovación

**Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:**
INTEROC S.A.

Av. Javier Prado Oeste 2442
Piso 16. Magdalena del Mar
Lima - Perú
Telf.: (511) 614-5100

Contenido Neto: 250 ml

No. de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Formulador:
**HEBEI VEYONG BIO-
CHEMICAL CO., LTD.**
393 East Heping Road,
Shijiazhuang City - China

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

"CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	N. COMÚN	N. CIENTÍFICO	L/cil de 200L	%		
Mandarina (<i>Citrus reticulata</i>)	Araña roja	<i>Panonychus citri</i>	0.2 - 0.25	-	7	0.01(a) 0.5 (b)
Fresa (<i>Fragaria vesca</i>)	Araña roja	<i>Tetranychus urticae</i>	0.15 - 0.20	-	7	0.02(a) 0.05 (b)
Palto (<i>Persea americana</i>)	Ácaro	<i>Oligonychus punicae</i>	0.2	-	15	0.01(a) 0.5 (b)
Vid (<i>Vitis vinifera</i>)	Ácaro	<i>Colomerus vitis</i>	0.1 - 0.15	0.05 - 0.075	28	0.01(a) 0.5 (b)
	Araña roja	<i>Tetranychus urticae</i>	0.25 - 0.30	-	28	0.01(a) 0.5 (b)

PC= Período de Carenza

LMR = Límite Máximo de Residuos.

(a) Abamectin

(b) Pyridaben



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

