

SIZE: 15.0 X 29.5 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- Después de usar este producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazoles
- En caso de intoxicación llamar al médico o llevar al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- Este producto no tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- Si se produce el contacto con los ojos, lave con abundante agua por lo menos 15 minutos, también lavar debajo de los párpados.
- En caso de contacto con la piel, quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Lavar la piel inmediatamente con abundante agua.
- En caso de inhalación, apartar al paciente del lugar de exposición, mantenerlo abrigado y en reposo. Brindar respiración artificial si lo requiere.
- En caso de ingestión, no provocar el vómito ni administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente.
- En caso de emergencia llamar a: **CICOTOX: 0800-1-3040 (atención las 24 horas)**
ó ESSALUD EN LINEA: 0801-10200 ó CISPQUIIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

- Después de usar el contenido enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

PACLO-AG

REGULADOR DE CRECIMIENTO AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada - SC

COMPOSICIÓN:

Paclobutrazol.....250 g/L
Aditivos.....c.s.p 1 L

Reg. PQUA N° 620 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

ESDRAS ANTONIO GÓMEZ CARDONA

Mz. 3 - Lt. 8, Urb.Los Jardines del Golf, Víctor Larco Herrera, Trujillo,
La Libertad, Perú -Telf: 044 - 289877 - Nextel: 831*5780
ventas@agrynova.com

FABRICANTE Y FORMULADOR:

SHANGHAI AGRYNOVA CO., LTD

Room 2105, QD 3102 Trend Centre 29 - 31 Chung Lee Street
Chai Wan, Hong Kong, China. Telf 0085-229-738324

IMPORTADOR:

AGriMorpho S.A.C.

Mz 3 Lt. 8 Jardines del Golf. Trujillo-Peru

Fecha de Formulación:

N° de Lote :

Contenido Neto : **1 L**

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PACLO-AG, es un regulador de crecimiento con acción sistémica. Estimula la capacidad reproductiva de las plantas mediante la inhibición de la síntesis de giberelinas.

Para la preparación de la mezcla:

- Agitar el contenido del producto en su envase original, luego verter la dosis recomendada en un cilindro conteniendo la mitad de agua limpia.
- Agitar hasta lograr una mezcla homogénea y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USO Y DOSIS:

Cultivo	Modo de Acción	Dosis		PC	LMR
		%	L/Ha		
Palto	Controla el crecimiento vegetativo Favorece la fructificación	0.8-0.9	6.4-7.2	90	0.5

PC: Periodo de carencia en días

LMR: Límite máximo de residuos en ppm

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

Utilizar PACLO-AG (Paclobutrazol) máximo una aplicación por campaña / año, en las etapas de inicio o hacia la mitad de la floración con panículas en crecimiento o al inicio de los picos del crecimiento vegetativo.

PERIODO DE REINGRESO

Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas las 24 horas.

COMPATIBILIDAD

PACLO-AG es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas de uso común a excepción de aquellos de reacción alcalina. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico para el cultivo si se usa a la dosis recomendada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.”



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

