

SIZE: 15.0 X 29.5 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- Después de usar este producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazoles
- En caso de intoxicación llamar al médico o llevar al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- Este producto no tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- Si se produce el contacto con los ojos, lave con abundante agua por lo menos 15 minutos, también lavar debajo de los párpados.
- En caso de contacto con la piel, quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Lavar la piel inmediatamente con abundante agua.
- En caso de inhalación, apartar al paciente del lugar de exposición, mantenerlo abrigado y en reposo. Brindar respiración artificial si lo requiere.
- En caso de ingestión, no provocar el vómito ni administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente.
- En caso de emergencia llamar a: **CICOTOX: 0800-1-3040 (atención las 24 horas)**
ó ESSALUD EN LINEA: 0801-10200 ó CISPROQUIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

- Después de usar el contenido enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

PACLO-AG

REGULADOR DE CRECIMIENTO AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada - SC

COMPOSICIÓN:

Paclobutrazol.....250 g/L
Aditivos.....c.s.p 1 L

Reg. PQUA N° 620 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

AGRYNOVA SAC

Av. Manuel Villarán 357, Dpto. 102, Urb. La Aurora, Miraflores. Lima
Perú. Teléfono: (044) 28 - 9877, Nextel: 831*5780.
info@agrynova.com, www.agrynova.com

FABRICANTE Y FORMULADOR:

JIANGSU SEVENCONTINENT GREEN CHEMICAL CO., LTD
28 Chengbei Road, Zhangjiagang city, Jiangsu 215600, China.
Telef: 0086-512-58609901 / 0086-512-58608378
www.sevencontinent.com

IMPORTADOR:



Fecha de Formulación:
N° de Lote :
Contenido Neto : **5 L**
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PACLO-AG, es un regulador de crecimiento con acción sistémica. Estimula la capacidad reproductiva de las plantas mediante la inhibición de la síntesis de giberelinas.

Para la preparación de la mezcla:

- Agitar el contenido del producto en su envase original, luego verter la dosis recomendada en un cilindro conteniendo la mitad de agua limpia.
- Agitar hasta lograr una mezcla homogénea y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USO Y DOSIS:

Cultivo	Modo de Acción	Dosis		PC	LMR
		%	L/Ha		
Palto	Controla el crecimiento vegetativo Favorece la fructificación	0.8-0.9	6.4-7.2	90	0.5

PC: Período de carencia en días
LMR: Límite máximo de residuos en ppm

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Utilizar PACLO-AG (Paclobutrazol) máximo una aplicación por campaña / año, en las etapas de inicio o hacia la mitad de la floración con panículas en crecimiento o al inicio de los picos del crecimiento vegetativo.

PERIODO DE REINGRESO

Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas las 24 horas.

COMPATIBILIDAD

PACLO-AG es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas de uso común a excepción de aquellos de reacción alcalina. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico para el cultivo si se usa a la dosis recomendada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas."



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



SIZE: 15.0 X 29.5 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- Después de usar este producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazoles
- En caso de intoxicación llamar al médico o llevar al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- Este producto no tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- Si se produce el contacto con los ojos, lave con abundante agua por lo menos 15 minutos, también lavar debajo de los párpados.
- En caso de contacto con la piel, quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Lavar la piel inmediatamente con abundante agua.
- En caso de inhalación, apartar al paciente del lugar de exposición, mantenerlo abrigado y en reposo. Brindar respiración artificial si lo requiere.
- En caso de ingestión, no provocar el vómito ni administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente.
- En caso de emergencia llamar a: **CICOTOX: 0800-1-3040 (atención las 24 horas)**
ó ESSALUD EN LINEA: 0801-10200 ó CISPROQUIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

- Después de usar el contenido enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

PACLO-AG

REGULADOR DE CRECIMIENTO AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada - SC

COMPOSICIÓN:

Paclobutrazol.....250 g/L
Aditivos.....c.s.p 1 L

Reg. PQUA N° 620 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

AGRYNOVA SAC

Av. Manuel Villarán 357, Dpto. 102, Urb. La Aurora, Miraflores. Lima
Perú. Teléfono: (044) 28 - 9877, Nextel: 831*5780.
info@agrynova.com, www.agrynova.com

FABRICANTE Y FORMULADOR:

SHANGHAI AGRYNOVA CO., LTD

Room 2105, QD 3102 Trend Centre 29 - 31 Chung Lee Street
Chai Wan, Hong Kong, China. Telf 0085-229-738324

IMPORTADOR:



Fecha de Formulación:
N° de Lote :
Contenido Neto : **5 L**
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PACLO-AG, es un regulador de crecimiento con acción sistémica. Estimula la capacidad reproductiva de las plantas mediante la inhibición de la síntesis de giberelinas.

Para la preparación de la mezcla:

- Agitar el contenido del producto en su envase original, luego verter la dosis recomendada en un cilindro conteniendo la mitad de agua limpia.
- Agitar hasta lograr una mezcla homogénea y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USO Y DOSIS:

Cultivo	Modo de Acción	Dosis		PC	LMR
		%	L/Ha		
Palto	Controla el crecimiento vegetativo Favorece la fructificación	0.8-0.9	6.4-7.2	90	0.5

PC: Período de carencia en días
LMR: Límite máximo de residuos en ppm

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Utilizar PACLO-AG (Paclobutrazol) máximo una aplicación por campaña / año, en las etapas de inicio o hacia la mitad de la floración con panículas en crecimiento o al inicio de los picos del crecimiento vegetativo.

PERIODO DE REINGRESO

Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas las 24 horas.

COMPATIBILIDAD

PACLO-AG es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas de uso común a excepción de aquellos de reacción alcalina. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico para el cultivo si se usa a la dosis recomendada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas."



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



SIZE: 14.5 X 14.5 cm

PACLO-AG

REGULADOR DE CRECIMIENTO AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada - SC

COMPOSICIÓN:

Paclobutrazol.....250 g/L
Aditivos.....c.s.p 1 L

Reg. PQUA N°620 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

AGRYNOVA SAC

Av. Manuel Villarán 357, Dpto. 102, Urb. La Aurora, Miraflores. Lima - Perú. Teléfono: (044) 28 - 9877
Nextel: 831*5780. info@agrynova.com, www.agrynova.com

FABRICANTE Y FORMULADOR:

SHANGHAI AGRYNOVA CO., LTD

Room 2105, QD 3102, Trend Centre, 29 - 31 Cheung Lee Street, Chai Wang, Hong Kong. Telef: +86 13723925566

IMPORTADOR:



Fecha de Formulación:
N° de Lote :
Contenido Neto : 5 L
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

SIZE: 14.5 X 14.5 cm

PACLO-AG

REGULADOR DE CRECIMIENTO AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada - SC

COMPOSICIÓN:

Paclobutrazol.....250 g/L
Aditivos.....c.s.p 1 L

Reg. PQUA N°620 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

AGRYNOVA SAC

Av. Manuel Villarán 357, Dpto. 102, Urb. La Aurora, Miraflores. Lima - Perú. Teléfono: (044) 28 - 9877
Nextel: 831*5780. info@agrynova.com, www.agrynova.com

FABRICANTE Y FORMULADOR:

JIANGSU SEVENCONTINENT GREEN CHEMICAL CO., LTD

28 Chengbei Road, Zhangjiagang city, Jiangsu 215600, China. Telef: 0086-512-58609901 / 0086-512-58608378

IMPORTADOR:



Fecha de Formulación:
N° de Lote :
Contenido Neto : 5 L
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

SIZE: 14.5 X 14.5 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO". " MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"										
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN -Este producto es de cuidado. No ingerir. -Causa irritación moderada a los ojos. -No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. -Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado. -Después de usar este producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada. -Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. -Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado. -No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas ni forrajes. -Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. -Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.						INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO PACLO-AG, es un regulador de crecimiento con acción sistémica. Estimula la capacidad reproductiva de las plantas mediante la inhibición de la síntesis de giberelinas. Para la preparación de la mezcla: -Agitar el contenido del producto en su envase original, luego verter la dosis recomendada en un cilindro conteniendo la mitad de agua limpia. -Agitar hasta lograr una mezcla homogénea y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado.				
"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"										
CUADRO DE USO Y DOSIS:										
Cultivo	Modo de Acción	Dosis		PC	LMR					
		%	L/Ha							
Palto	Controla el crecimiento vegetativo. Favorece la fructificación	0.8-0.9	6.4-7.2	90	0.5					
PC: Periodo de carencia en días LMR: Limite máximo de residuos en ppm										
FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION Utilizar PACLO-AG (Paclobutrazol) máximo una aplicación por campaña / año, en las etapas de inicio o hacia la mitad de la floración con panículas en crecimiento o al inicio de los picos del crecimiento vegetativo.										
PERIODO DE REINGRESO Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas las 24 horas.										
COMPATIBILIDAD PACLO-AG es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas de uso común a excepción de aquellos de reacción alcalina. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.										
FITOTOXICIDAD No es fitotóxico para el cultivo si se usa a la dosis recomendada en la etiqueta.										
RESPONSABILIDAD CIVIL <i>"El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas."</i>										
 										