

KOHINOR[®] 70 WG

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Composición Química:

Imidacloprid..... 700 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg PQUA N° 498-SENASA

Titular del Registro:
 **Proficol**
PROFIANDINA PERÚ S.A.
Calle Mártir Olaya N° 169. Of. 705. Miraflores.
Lima - Perú. Telf.: (01) 255-7190.

Formulado por:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD
Beer Sheva 84100. Israel

Importado y Distribuido por :
PROFIANDINA PERÚ S.A.

Lote N°

CONTENIDO NETO: 250 gramos

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTENGA EL PRODUCTO BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado no ingerir.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilizar ropa protectora durante la mezcla y aplicación y para re-ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas y/o forrajes.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Neonicotinoides
- En caso de presentarse síntomas de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- Este producto no tiene antídoto específico, realizar tratamiento sintomático.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito. Lavar la boca con abundante agua.
- No dar nada por la boca al paciente si se encuentra inconsciente. Buscar ayuda médica.
- En caso de inhalación, sacar a la víctima al aire libre, mantenerla abrigada y en reposo. Si la respiración se dificulta, dar oxígeno. Si no hay respiración dar respiración artificial. Acuda a un médico inmediatamente.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar toda el área de la piel expuesta con jabón y agua, enjuagar con agua por 20 minutos.
- Si la irritación persiste consultar a un médico.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca manteniendo el párpado bien abierto, remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagando.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA (líneas gratuitas)

CISPROQUIM: 080-050-847

CICOTOX : 0800- 1-3040

INFOSALUD: 0800-10-828

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para las abejas o artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración. No asperjar cerca de colmenas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y/o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

KOHINOR® 70 WG es un insecticida sistémico que actúa por contacto e ingestión sobre una amplia variedad de insectos. Puede ser utilizado dentro de estrategias de manejo integrado de plagas.

Preparar una pre-mezcla diluyendo la dosis recomendada de KOHINOR® 70 WG en un recipiente con agua, llevar esta solución al tanque aspersor manteniendo el agitador en movimiento durante el llenado y completar con agua hasta alcanzar el volumen requerido. El agitador debe permanecer en movimiento durante la aplicación. Aplicar en aspersión al follaje con cualquier equipo de pulverización terrestre.

Previo a la aplicación asegurarse que el equipo de pulverización se encuentre en buenas condiciones de uso y correctamente calibrado para evitar sobre o sub-dosificaciones del producto. Realizar la aplicación con gotas finas y cobertura uniforme. Se recomienda utilizar boquillas de cono hueco.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

Máximo 2 aplicaciones por campaña (1 campaña/año)

Intervalo mínimo entre aplicaciones : 5 - 7 días.

Momento y frecuencia: A los primeros indicios de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO:

Se podrá ingresar al campo sin ropa de protección después de 24 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD:

En caso de mezclas con otros productos, se recomienda bajo responsabilidad del usuario, realizar evaluaciones previas a pequeña escala, con el fin de determinar la compatibilidad física y fitocompatibilidad de la mezcla a usar.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a los cultivos y dosis indicadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cuadro de Usos y Dosis

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (kg/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
TOMATE	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.625	3	0.5

P.C.: Periodo de Carencia

LMR : Límite Máximo de Residuos

