

# SEEDOPRID® 70 WS

## INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO DISPERSABLE PARA TRATAR SEMILLAS (WS)

**Composición Química:**

Imidacloprid ..... 700 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1Kg

Reg PQUA N° 546-SENASA

Titular del Registro:  
 **Proficol**  
PROFIANDINA PERÚ S.A.  
Calle Mártir Olaya N° 169. Of. 705. Miraflores .  
Lima - Perú. Telf.: (01) 255-7190.

Formulado por:  
FREGATA S.A.

Para:  
Celsius property BV, Amsterdam (NL)  
Neuhausen a. Rhf Branch  
Rheinweg 7 CH 8200 Schaffhausen. Switzerland

Importado y Distribuido por:  
PROFIANDINA PERÚ S.A.

**CONTENIDO NETO: 1 KILOGRAMO**

Lote N°

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO**

**DAÑINO**

**LEA LA ETIQUETA, ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de tratamiento de semillas y siembra.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar el polvo y la aspersión.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilizar ropa protectora, guantes, botas, gafas y mascarilla durante el manejo, tratamiento de semillas, siembra y para re-ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas y/o forrajes.
- Guardar este producto en ambientes cerrados, secos y aireados.
- Evite el contacto con la piel, ojos y boca.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- **GRUPO QUÍMICO: NEONICOTINOIDE**
- En caso de presentarse síntomas de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito. Lavar la boca con abundante agua. No dar nada por la boca al paciente si se encuentra inconsciente. Buscar ayuda médica.
- En caso de inhalación, sacar a la víctima al aire libre, mantenerla abrigada y en reposo. Si la respiración se dificulta, dar oxígeno. Si no hay respiración dar respiración artificial. Acuda a un médico inmediatamente.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa afectada y lavar toda el área de la piel expuesta con jabón suave y agua, enjuagar con agua tibia. Buscar atención médica en caso de observar síntomas de intoxicación.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca manteniendo el párpado bien abierto. Consulte a un médico.

**Nota al médico:**

- No existe antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA (líneas gratuitas)**  
 CISPROQUIM: 080-050-847  
 CICOTOX : 0800-1-3040  
 INFOSALUD: 0800-10-828

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, destruya la bolsa y deposítela en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No utilice esta bolsa para conservar alimentos o agua.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para abejas y otros artrópodos benéficos.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para animales domésticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o bolsas vacías.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**SEEDOPRID® 70 WS** es un insecticida sistémico de largo efecto residual que actúa por contacto e ingestión. Esta recomendado para el tratamiento de semillas.

En un recipiente adecuado, hacer la preparación utilizando la dosis recomendada y un volumen de agua equivalente a 20 ml por kg de semilla, agitar hasta lograr una mezcla homogénea. Orear las semillas a la sombra y una vez secas sembrarlas.

Preparar solo la cantidad que se utilizará en el día. No es conveniente dejar el producto preparado de un día para otro.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

**SEEDOPRID® 70 WS** al ser un producto para el tratamiento de semillas, es utilizado una sola vez por campaña.

**PERIODO DE REINGRESO:**

No ingrese a las áreas tratadas, sin vestimenta de protección, durante 48 horas después de realizada la siembra.

**COMPATIBILIDAD:**

En caso de mezclas con otros productos se recomienda bajo responsabilidad del usuario realizar evaluaciones previas a pequeña escala con el fin de determinar la compatibilidad física y fitocompatibilidad de la mezcla a usar.

**FITOTOXICIDAD:**

No es fitotóxico a los cultivos recomendados a las dosis indicadas en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas,

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

**Cuadro de Usos**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	DILUCIÓN EN AGUA	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico				
Maíz	Gusano picador	<i>Elasmopalpus lignosellus</i>	5 g/kg de semilla	20 ml /kg de semilla	No aplicable	0.02 (mazorca) 0.2 (forraje seco)

P.C.: Periodo de Carencia      LMR: Límite Máximo de residuos

