"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"



# PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

# INSECTICIDA AGRÍCOLA

**POLVO SOLUBLE (SP)** 

# COMPOSICIÓN:

Aditivos ...... c.s.p. 1 Kg

## Reg. PQUA Nº 584 - SENASA

# Titular del Registro INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.

Av. Javier Prado Este N° 6728 Int. 301-A Urb. Santa Patricia II Etapa La Molina, Lima, Perú Teléfono: (01) 499-7831



# Formulador: POINT AGRO-CHINA LTD

Rm 1206, Kaisa Plaza, 1091 East Renmin Road Jiangyin, Jiangsu, China Telf.: (86-510) 8061 8102

Importador y distribuidor: AGROPECUARIA WJ & ANT. ALIS. LAS PALMERAS S.A.C.

Mz. F Lote 20 Asoc. Sr. de Los Milagros Alto de la Alianza -Tacna - Perú Teléfono: 952213521-944733849



Contenido Neto: 200 gramos

Lote No.

echa de Formulación: a de Vencimiento:

**NO CORROSIVO** 

NO INFLAMABLE

**NO EXPLOSIVO** 

LIGERAMENTE PELIGROSO **CUIDADO** 

### "LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTQ" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS#

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y API ICACIÓN

- Tóxico y altamente peligroso por inhalación, evitar respirar el polvo de la aspersión
- Altamente irritante al tracto y vías respiratorias.
- Tóxico por ingestión.
- Ligeramente irritante a la piel y a los ojos.
- No reutilizar los envases vacíos para almacenar alimentos ni
- Almacenar el producto en ambiente fresco y ventilado, fuera de ambientes habitados por personas o animales.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezda y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado - Después de usar el producto cámbiese. Jave la ropa contaminada v báñese con abundante agua y jabón.
- Útilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación Ingresar al área tratada después de 48 noras de utilizado el producto.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
   Utilizar mascarilla de protección durante la mezcla y aplicación del

# INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico. Neonicotinoide En caso de intoxicación oral o inhalatoria lleve al paciente inmedia amente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestion accidental conviene vaciar el estómago induciendo al vómito, eliminar artificialmente la parte ingerida realizando el aspirado y lavado gástrico con una solución de bicarbonato de sodio al 5%.

o dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente. Teléfonos de Emergencia:

SAMU: 106 / INAP: (01) 499-7831

### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa córtandola. Entréquela o deposítela en lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua
- de al menos 10 metros.
   El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

  - Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrante recoger el producto y depositarlo en el tio destinado por las autoridades locales para este fin.

## NSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ORTALEZA 20 SP es un insecticida que presenta como grediente activo al acetamiprid que pertenece al grupo de los eonicotinoides. Presenta una acción sistémica, de contacto y translaminar. Es absorbido rápidamente por el follaie v su penetración asegura una rápida residualidad.

FORTALEZA 20 SP afecta el sistema nervioso de los insectos causándoles la muerte: además tiene un efecto sobre huevos ninfas v adultos de insectos.

Las aplicaciones de FORTALEZA 20 SP se realizan en campo abierto y en condiciones de invernadero requiriendo para ello la utilización de equipos de protección. Siempre se debe mezclar la dosis recomendada en la etiqueta sobre agua limpia (el volumen de agua depende de cada cultivo y el momento fenológico, valor referencial es 400 L/ha).

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar FORTALEZA 20 SP máximo 1 aplicación / campaña / año, dependiendo del grado de infestación de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO.- Se puede ingresar al campo sin equipo de protección 48 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD.- FORTALEZA 20 SP es compatible con la mayoría de plaquicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina

FITOTOXICIDAD.- FORTALEZA 20 SP no es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL. El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

#### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CONSIDER CON SIX INCLINENCE ACTIONS						
Cultivo	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	g/cil	g/ha	(dias)	(ppiii)
Algodón	"Mosca blanca"	Bemisia argentifolii	200-250	400-500	14	0.5
Tomate	"Mosca blanca"	Bemisia tabaci	100-150		7	0.2
Palto	"Queresa del palto"	Fiorinia fioriniae	100-150		7	0.01

P.C.: Periodo de carencia LM R: Límite Máximo de Residuos























