



Antracol[®]

70% PM

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Propineb, 700 g/kg
Aditivos, csp 1 kg

Reg. N° 043-96-AG-SENASA

Titular del Registro:

Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 10. San Isidro.

Formulado por:

Bayer S.A.
Av. Américas 57-52
Bogotá DC - Colombia

Importado y distribuido por:

Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
San Isidro. Lima-Perú
Telf: 2113800

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE
NO EXPLOSIVO**

**Contenido
Neto: 400 g.**

Lote N°
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

© = Marca Registrada del grupo Bayer

LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO “MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Durante su manipuleo (preparación de la mezcla y aplicación) deben emplearse máscara, guantes protectores y ropa apropiada. No comer, beber ni fumar. Terminada la labor, lavarse con agua y jabón y cambiarse de ropa. Evitar la contaminación de cultivos alimenticios, forrajeros y fuentes de agua. Almacenarlo en su envase herméticamente cerrado en lugares adecuados, lejos del alcance de los niños y animales domésticos. No se debe almacenar ni transportarlo conjuntamente con productos alimenticios (frescos o en conservas), forrajeros, medicinas y bebidas. No es tóxico para abejas.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión, provocar el vómito si el paciente está consciente, repetir hasta que el vómito fluya claro. Dar de beber mucha agua (ni leche ni alcohol ni aceite) y una suspensión de 10 mg o más de carbón medicinal en 150-200 ml de agua cada 4-6 horas hasta la mejoría del paciente.

Si se ha inhalado, alejar al paciente del área contaminada a un lugar fresco y ventilado; son eficaces las inhalaciones de manzanilla. Mantenerlo en reposo. Si se han contaminado los ojos lavar con agua limpia durante 15 minutos. Si el producto ha entrado en contacto con la piel, quitar la ropa y lavar las partes afectadas con abundante agua y jabón por lo menos durante 15 minutos.

Por aspiración y por contacto, se observan casos de rinitis; faringitis; bronquitis; dermatitis y conjuntivitis.

INDICACIONES PARA EL MEDICO: Se recomienda tratamiento sintomático.

ANTÍDOTO: No se ha determinado un antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN:

CICOTOX: 0800-1-3040 CISPQUIM: 0800-5-0847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

"Después de usar el contenido de este envase, destrúyalo y deposítalo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases".

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques. Aplique el producto como se indica en la etiqueta, no reutilice los envases, destrúyalos.

INFORMACION GENERAL

Antracol 70% Polvo Mojable es un fungicida preventivo del grupo de los ditiocarbamatos que se aplica en pulverizaciones, previa mezcla a agua y desinfección de semilla.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Se aplica en pulverizaciones, previa mezcla en agua. Es recomendable preparar previamente una mezcla en un volumen reducido de agua agitando continuamente y luego agregar el resto del agua al tanque de aspersión.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar preventivamente o al constatar los primeros síntomas de la enfermedad, procurando un total cubrimiento de las plantas.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas.

COMPATIBILIDAD:

Presenta buena compatibilidad con los cultivos recomendados y con los principales plaguicidas y fertilizantes foliares, excepto los de reacción alcalina se deben emplear inmediatamente después de preparadas.

FITOTOXICIDAD:

No presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas."

USO ESPECIFICO

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

I. Como fungicida de aspersión

Cultivo	Enfermedad		Kg/ha	Dosis		P.C.* (días)	L.M.R.** (ppm)
	Nombre común	Agente Causal		kg/cil 200 l	% (1)		
Algodonero	Mancha negra de la hoja	<i>Alternaria alternata</i>	1.5-2.5	0.5-0.6	0.25-0.30	7	3
Aji	Cercosporiasis	<i>Cercospora capsici</i>					
Haba	Mancha de la hoja	<i>Cercospora zonata</i>					
Papa, Tomate	Hielo fungoso	<i>Phytophthora infestans</i>	1.5-2.5	0.5-0.6	0.25-0.30	7	0.1
Sandía	Mildiu	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	1.5-2.5	0.5-0.6	0.25-0.30	7	1
Melón						7	0.5
Zapallo						7	0.2
Melón	Mancha de la hoja	<i>Alternaria spp.</i>	1.5-2.5	0.5-0.6	0.25-0.30	7	0.5
Naranja	Podredumbre gris de las flores	<i>Botrytis cinerea</i>	3.6	0.5-0.6	0.25-0.30	7	2
Vid						28	1
Fresa						7	3
Espárrago	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	1.5-3.0	0.5-0.6	0.25-0.30	30	2
Arroz	Mancha carmelita	<i>Helminthosporium oryzae</i>	1.5-2.0	-	-	7	0.05
Esparrago	Mancha foliar	<i>Stemphylium vesicarium</i>	2.0	1	0.5	30	0.05
Palto	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	-	0.25	N.d	0.05
Cebolla	Mancha foliar	<i>Stemphylium vesicarium</i>	1.5	0.5	-	7	0.05
Vid	Mildiu	<i>Plasmopara viticola</i>	-	-	0.25-0.375	28	1
Mandarina	Podredumbre gris de las flores	<i>Botrytis cinerea</i>	-	-	0.3-0.375	14	0.05
Granado	Mancha negra de la hoja	<i>Alternaria alternata</i>	-	-	0.3-0.375	14	0.05

PC* = Periodo de carencia LMR** = Límite máximo de residuos n/d = No determinado

(1) Utilizar la dosis en concentración cuando se aplica con pulverizadora manual de mochila. En caso de aplicar con atomizadora a motor ó tractor, emplear la dosis en kg/ha previa calibración de los equipos de aplicación.

II. Como desinfectante de semilla

Cultivo	Enfermedad	Agente causal	Dosis
Arroz	Manchado de la semilla y Manchado de la hoja Manchado de la semilla y Mancha carmelita Manchado de la semilla y Podredumbre del tallo	Trichoconis padwickii, Curvularia sp., Alternaria sp, Helminthosporium oryzae Fusarium sp.	2 gr por 1 Kg de semilla ó 200 gr por 100 Kg de semilla

