

<b>Unigraf</b> s.a.c. IMPRESA	FECHA:	14-09-09	<b>COLORES:</b>  ■ PANTONE 485 C LOGO ARIS ■ PANTONE Yellow C ■ NEGRO ■ PANTONE 199 C	<b>OBSERVACIONES:</b>
	VERSION:	UV: 1		
<b>CLIENTE:</b> ARIS INDUSTRIAL		<b>ETIQUETA NUEVA</b>		
<b>FORMATO:</b> ETIQUETA PERMEKILL x 500 mL				
<b>MEDIDAS:</b> 22.2x 12.4 cm	<b>PROGRAMA:</b> COREL 13	<b>OPERADOR:</b> GEORGETTE SANCHEZ		

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO**

- No comer, no beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Usar máscara, guantes y gafas protectoras durante el manejo del producto.
- Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado en un ambiente seco, sombreado y ventilado.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese de ropa y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Irritante a la piel y a los ojos.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y la hoja adjunta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel lávese con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.**

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CICOTOX 0800-1-30-40 ALÓ ESSALUD 0801-10-200 (Las 24 Horas) Y ARIS INDUSTRIAL S.A. (01) 336 5428

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de utilizar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos, no contaminar lagos, ríos, estanques y fuentes de agua con los desechos y envases vacíos ni con los restos de aplicación sobrantes del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.
- Peligroso para las abejas y nocivo para la fauna benéfica.
- No aplicar en época de floración.
- Mantener la banda de protección de 5 metros hacia fuentes de agua.
- Tóxico para ganado.

# PERMEKILL 50 EC

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC**

**COMPOSICIÓN:**

Permetrina.....500 g/L  
Inertes.....500 g/L

**Registro PQUA Nro.: 066 - SENASA**

**TITULAR DEL REGISTRO: PINERAL ANDINA S.A.**  
Av. Flora Tristán 463 Of. 201 Urb. Sta. Patricia II Etapa.  
La Molina, Lima Perú.  
Telf.: 348-1018 / Telefax: 349-9609



**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: ARIS INDUSTRIAL S.A.**  
Av. Industrial 491, Lima, Perú. Telef: 336 5428

**FABRICADO Y FORMULADO POR: Point Agro-China Ltd.**  
1505-1506, Diamond Business Centre,  
Nanxing Street, Hangzhou  
China



**NO EXPLOSIVO INFLAMABLE CORROSIVO**



Contenido Neto: 500 ml

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

PERMEKILL 50 EC es un insecticida Piretroide que actúa por contacto e ingestión. PERMEKILL 50 EC se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar. Recomendamos regular el pH del agua a 4, que es el que requiere la PERMETRINA para cumplir con sus características de control.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"  
CUADRO DE USOS**

Cultivos	Plagas		Dosis		Periodo de carencia (Días)	LMR ppm
	Nombre técnico	Nombre común	L/ha	ml/200 L		
Alfalfa	Spodoptera eridania	Gusano ejército	0.20	100	7	2.5
Tomate	Tuta absoluta	Pollilla	0.30	150	7	1
Alcachofa	Heliothis virescens	Gusano perforador	0.4-0.5	200-250	0	10
Cebolla	Trips ta baci	Trips	0.2-0.3	100-150	1	0.1
Espárrago	Copitarsia decolora	Gusano del turión	0.5	250	1	1
Páprika	Spodoptera frugiperda	Gusano defoliador	0.4-0.5	200-250	3	1

LMR: Limite máximo de residuos expresados en ppm.  
Volumen de agua recomendado 400 L/ha

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Las aplicaciones pueden repetirse a los 14 días en caso de reinfestación. Se puede aplicar en cualquier etapa fisiológica del cultivo, hasta los 7 días antes de la cosecha. Máximo dos aplicaciones por campaña.

**PERIODO DE REINGRESO**

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

Es compatible con la gran mayoría de insecticidas y plaguicidas de uso común excepto con los de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico usado a la dosis recomendada en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

AREA SIN BARNIZ



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

