

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA
 ANTES DE USAR EL PRODUCTO
 MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DAÑINO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para re-ingresar al área tratada en las primeras 48 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Carbamatos
- Antídoto: Sulfato de atropina.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y hoja informativa adjunta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- **Teléfonos de Emergencia:**
 CICOTOX : 0800-1-3040
 ESSALUD en línea : (01) 411-8000 anexo 4
 CISPROQUIM: 080-050-847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en a mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



Methomex®

20 LS

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN

Methomyl 200 g/L
 Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. N° 241-96-AG-SENASA

Titular del Redgistro por:
ADAMA Agriculture Peru S.A.
 Av. El Derby N° 254 Of. 503.
 Santiago de Surco. Lima - Perú.
 Teléfono: (01)641-0000



Contenido neto: **500 ml**
 Lote No.
 Fecha de Formulación:
 Fecha de Vencimiento:



**MODERADAMENTE PELIGROSO
 DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Methomex 20 LS es un insecticida carbamato de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión. Tiene rápida acción y se degrada rápidamente en el medio ambiente y las plantas, por lo que no requiere largos periodos de espera antes de la cosecha.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA	DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
		Conc (%)	L/ha		
ALFALFA	“Caballada” Anticarsia gemmatalis	0,4 - 0,5	2,0 - 2,5	7	0,02
MAÍZ	“Cogollero” Spodoptera frugiperda	0.3 - 0.4	1,5 - 2,0	0	0,02
NARANJO	“Queresa redonda” Selenaspilus articulatus	0,2 - 0,3	-	7	1,0
TOMATE	“Gusano del fruto” Spodoptera eridania	0,4 - 0,5	2,0 - 4,0	1	1,0

P.C.: Periodo de carencia LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACION

Realizar las aplicaciones al inicio de la infestación de la plaga y repetir cada 10 días según el grado de re-infestación.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al área tratada durante 48 horas después de aplicado el producto a menos que se utilice ropa de protección.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Ver Hoja Informativa adjunta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Dimensiones: 230 mm x 120 mm
 Esta etiqueta requiere Hoja Informativa