

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes. No almacenar en casa habitación.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en un ambiente seco, sombreado y bien ventilado.
- Después de usar el producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar la aspersión.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Conserve el producto en su envase original, bien cerrado, etiquetado en un lugar fresco alejado del calor, seco y bajo llave.

INTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico : Aryl Pirroles

- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos; si la irritación es grave, buscar asistencia médica.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- No se ha determinado antídoto específico, no inducir al vomito.
- Nota al médico: Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX 0-800-1-3040 ó 328-7398
POINT ANDINA S.A. (01) 3481018

CENTRO NACIONAL DE EMERGENCIAS DE ESSALUD : 117

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilizarlo triturándolo y/o perforándolo y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
 - Ningún envase que haya contenido plaguicida debe usarse para conservar alimentos o agua para consumo.
 - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
 - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- #### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos.
 - Peligroso para organismos acuáticos.
 - No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
 - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
 - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
 - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
 - En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.



Fusion®

240 SC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición Química:

Chlorfenapyr 240 gr/Lt
Aditivos c.s.p 1 Lt

Registro PQUA N° 629 SENASA

Titular de Registro: POINT ANDINA S.A.



Calle Loreto Mz A6 Lote 15
Urb. Santa Patricia La Molina
Lima- Perú
Telf: (01) 3481018

Fabricado

y Formulado por:

Point Internacional Ltd
42 St. Margarets Grove
Twickenham TW11JG, England
Tel. 44-0-208-892-3862

Importado y

Distribuido por:

Soluciones Técnicas Del Agro S.A.C.
Av. Guillermo Dansey 2176
Lima Cercado - Perú
Telf : (01) 3368645
Fax : (01) 3368299

Softagro®
Soluciones Técnicas del Agro S.A.C.

Contenido Neto: 1Lt

N° Lote
Fecha de Form.
Fecha de Venc.

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FUSION 240 SC es un insecticida acaricida de contacto e ingestión su uso está destinado en campo abierto en el cultivo de tomate para prevenir y controlar el ataque de *Spodoptera eridania*.

Para su aplicación, mezclar la dosis recomendada en un poco de agua hasta obtener una suspensión uniforme. Luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua requerido hasta la capacidad total. Aplicar con una mochila manual o motorizada buscando obtener un tamaño de gota fina para una adecuada cobertura sobre el cultivo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	mL/cilindro 200 L	Lt/Ha		
Tomate	Gusano masticador	<i>Spodoptera eridania</i>	125-150	0.25-0.3	7 días	0.05

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC : Periodo de carencia

Frecuencia y época de aplicación

El número de aplicaciones del **FUSION 240 SC** está en función al nivel de daño del insecto sobre el cultivo. Se recomienda hacer aplicaciones cada 15 días. El número de aplicaciones por campaña pueden ser de hasta 2.

Periodos de Reingreso

No entre a las áreas tratadas durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

Compatibilidad

FUSION 240 SC en general se aplica solo con un surfactante. Se recomienda no mezclar **FUSION 240 SC** con ningún otro insecticida.

Fitotoxicidad

FUSION 240 SC no es fitotóxico al cultivo y dosis indicada en la etiqueta.

Responsabilidad civil

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

