

MEDIDAS: 35.5 CM X 27.5 CM  
DICIEMBRE DEL 2024  
AG



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

**Composición:**

Mancozeb.....	640 g/kg
Cymoxanil.....	80 g/kg
Aditivos.....	280 g/kg

Reg. PQUA N° 630 - SENASA

Titular del registro:

**GENAGRO S.A.**

**Formulado por:**

**EASTCHEM CO., LTD**

Floor 26, Haoyuan Mansion, NO.266,  
Middle Tongjiang Road, Changzhou,  
Jiangsu, China.

Teléfono: 86-519-68786696

Email: [www.eastchem.net](http://www.eastchem.net)

**Importado y Distribuido por:**

**GENAGRO S.A.**

Av. Javier Prado Este N° 6210,  
Oficina. 401, La Molina.

Lima - Perú

Teléfono: (511) 4193030

E-mail: [info@genagro.com.pe](mailto:info@genagro.com.pe)

**Contenido Neto: 1kg**

Lote N°:

Fecha de Fab.:

Fecha de Exp.:



**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o aspersión.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en lugares frescos, secos y bien ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Ditiocarbamato (mancozeb) + Cianoacetamidaoxima (cymoxanil).
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona no está consciente.
- En caso de contacto con los ojos, levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, trasladar a la persona al aire libre. Mantenerla en reposo y abrigada. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Nota al médico: No hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
SAMU: 106  
GENAGRO S.A.: (01) 419-3030

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido de la bolsa inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrante del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- **RUDO** es un fungicida preventivo y curativo que es absorbido rápidamente a través del follaje y es muy efectivo en los estados iniciales de la infección.
- **RUDO** tiene acción sistémica (cymoxanil) y de contacto (mancozeb).
- **RUDO** se emplea previa mezcla en agua, siendo recomendable una premezcla en un volumen menor de agua. Se agita continuamente y agrega el resto de agua hasta completar el volumen requerido.
- Aplicar el producto en pulverizaciones al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochila, atomizador, etc.) que se encuentra en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado y tratando de realizar una buena cobertura, mojando bien el cultivo.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	(Kg/ha)	(Kg/200L)		
Cebolla	Mildió	<i>Peronospora destructor</i>	2.0	-	7	Mancozeb: 1.5 Cymoxanil: 0.05
Papa	Rancho	<i>Phytophthora infestans</i>	1.5 - 2.0	-	14	Mancozeb: 0.2 Cymoxanil: 0.05
Vid	Mildió	<i>Plasmopara viticola</i>	-	0.5 - 0.75	14	Mancozeb: 1.5 Cymoxanil: 0.2
Quinua	Mildió	<i>Peronospora farinosa</i> <i>Esp. chenopodii</i>	-	0.50 - 1.00	25	0.05

PC: Periodo de Carencia / LMR: Límite Máximo de Residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

- Iniciar las aplicaciones de forma preventiva o a la aparición de los primeros síntomas.
- Se recomienda realizar máximo 1 aplicación de **RUDO** por campaña y 2 por año.

**PERIODO DE REINGRESO**

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**RUDO** es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común, excepto con aquellos de reacción alcalina. Al realizar la mezcla es recomendable efectuar una confirmación previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

**RUDO** no es fitotóxico usado a las dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

