

MEDIDAS: 35.5 CM X 27.5 CM
DICIEMBRE DEL 2024
AG



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Composición:

Mancozeb.....	640 g/kg
Cymoxanil.....	80 g/kg
Aditivos.....	280 g/kg

Reg. PQUA N° 630 - SENASA

Titular del registro:
GENAGRO S.A.

Formulado por:

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Kalpataru Square, 4th Floor,
Kondivita Road Off Andheri Kurla
Road, Andheri (E), Mumbai.
400 059 India.

Importado y Distribuido por:

GENAGRO S.A.
Av. Javier Prado Este N° 6210,
Oficina. 401, La Molina.
Lima - Perú
Teléfono: (511) 4193030
E-mail: info@genagro.com.pe

Contenido Neto: 1kg
Lote N°:
Fecha de Fab.:
Fecha de Exp.:



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

MEDIDAS: 35.5 CM X 27.5 CM
DICIEMBRE DEL 2024
AG

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o aspersión.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en lugares frescos, secos y bien ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Ditiocarbamato (mancozeb) + Cianoacetamidaoxima (cymoxanil).
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona no está consciente.
- En caso de contacto con los ojos, levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, trasladar a la persona al aire libre. Mantenerla en reposo y abrigada. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Nota al médico: No hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
GENAGRO S.A: (01) 419-3030

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido de la bolsa inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrante del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **RUDO** es un fungicida preventivo y curativo que es absorbido rápidamente a través del follaje y es muy efectivo en los estados iniciales de la infección.
- **RUDO** tiene acción sistémica (cymoxanil) y de contacto (mancozeb).
- **RUDO** se emplea previa mezcla en agua, siendo recomendable una premezcla en un volumen menor de agua. Se agita continuamente y agrega el resto de agua hasta completar el volumen requerido.
- Aplicar el producto en pulverizaciones al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochila, atomizador, etc.) que se encuentra en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado y tratando de realizar una buena cobertura, mojando bien el cultivo.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	(Kg/ha)	(Kg/200L)		
Cebolla	Mildió	Peronospora destructor	2.0	-	7	Mancozeb: 1.5 Cymoxanil: 0.05
Papa	Rancha	Phytophthora infestans	1.5 - 2.0	-	14	Mancozeb: 0.2 Cymoxanil: 0.05
Vid	Mildió	Plasmopara viticola	-	0.5 - 0.75	14	Mancozeb: 1.5 Cymoxanil: 0.2
Quinua	Mildió	Peronospora farinosa f.sp. chenopodii	-	0.50 - 1.00	25	0.05

PC: Periodo de Carencia / LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Iniciar las aplicaciones de forma preventiva o a la aparición de los primeros síntomas.
- Se recomienda realizar máximo 1 aplicación de **RUDO** por campaña y 2 por año.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

RUDO es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común, excepto con aquellos de reacción alcalina. Al realizar la mezcla es recomendable efectuar una confirmación previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

RUDO no es fitotóxico usado a las dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

