

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Moderadamente peligroso por inhalación.
- Moderadamente irritante a las vías respiratorias y tracto respiratorio.
- Moderadamente irritante a la piel, usar equipo de protección de la piel y cuerpo.
- Ligeramente irritante a los ojos, usar gafas protectoras.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No utilizar los envases vacíos para almacenar alimentos, ni bebidas.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo Químico: Neonicotinoide
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua durante 15 minutos y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón, durante 15 minutos. Consultar al médico especialista.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

**CICOTOX: 0800 - 1 - 3040** **BIOAGROCORP TRADING SAC: 478-2002**

- Nota al médico: No tiene antídoto específico. Dar tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para las abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.

# FORTAGE

## 350 SC

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSION CONCENTRADA - SC**

**COMPOSICIÓN:**

Imidacloprid ..... 350 g/l  
Aditivos ..... c.s.p. 1 lt

Reg. PQUA N° 631 - SENASA  
Titular del Registro: **BIOAGROCORP TRADING S.A.C.**

Importado y distribuido por:  
**BIOAGROCORP TRADING S.A.C.**



Calle Los Flamencos N° 121 Interior 6 Santa Anita - Lima 43  
Teléfono: 478-2002 Fax: 362-0014

Fecha de Formulación:  
N° de Lote:  
Contenido neto: 1L  
Fecha de Vencimiento:

Formulado por:  
NANJING RHONQUIM CO., LTD.  
N° 26 Maja Street, Nanjing Jiangsu, 210009  
CHINA

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**FORTAGE 350 SC** es un insecticida sistémico con actividad translaminar que actúa por contacto e ingestión.

**FORTAGE 350 SC** es un insecticida de amplio espectro, para el control de insectos succionadores en espárrago, pimiento, papa, mandarina y arroz.

**FORTAGE 350 SC** se prepara diluyendo la dosis en un cilindro con la mitad de agua, agitar bien y completar con agua al volumen total.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

| CULTIVO   | PLAGA                                 |  | DOSIS    |      | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|-----------|---------------------------------------|--|----------|------|----------------|-----------------|
|           | NOMBRE COMÚN                          | NOMBRE TÉCNICO                           | L/200 L  | L/Ha |                |                 |
| Espárrago | Mosquilla de los brotes               | <i>Prodioplosis longifila</i>            | 0.2      | 0.5  | 7              | 0.05            |
| Pimiento  | Mosca blanca                          | <i>Bemisia tabaci</i>                    | 0.2      | 0.5  | 7              | 0.5             |
| Papa      | Caracha (mosquilla de los brotes)     | <i>Prodioplosis longifila</i>            | 0.2      | 0.6  | 14             | 0.5             |
| Mandarina | Queresa coma                          | <i>Lepidosaphes beckii</i>               | 0.14     | 0.7  | 30             | 1.0             |
| Arroz     | Cigarrita del virus de la hoja blanca | <i>Tagosodes (=Sogatodes) orizicolus</i> | 0.2      | 0.2  | 30             | 1.5             |
| Vid       | Filoxera                              | <i>Viteus vitifoliae</i>                 | 0.1-0.15 | -    | 30             | 1.0             |

P.C.: Periodo de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Iniciar el tratamiento con **FORTAGE 350 SC** cuando el nivel de daño económico lo justifique luego de una previa evaluación del campo. Realizar hasta 3 aplicaciones por campaña/cultivo.

**PERIODO DE REINGRESO:** Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas.

**COMPATIBILIDAD:** **FORTAGE 350 SC** es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso frecuente. Es incompatible con productos de reacción alcalina, ácida u oxidante fuerte.

**FITOTOXICIDAD:** **FORTAGE 350 SC** no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se siguen las instrucciones señaladas en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

