

0.7 cm

21.0 cm

0.5 cm

7.7 cm

1.20 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Moderadamente peligroso por inhalación.
- Moderadamente irritante a las vías respiratorias y tracto respiratorio.
- Moderadamente irritante a la piel, usar equipo de protección de la piel y cuerpo.
- Ligera irritante a los ojos, usar gafas protectoras.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante jabón
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo Químico: Neonicotinoide
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua durante 15 minutos y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón, durante 15 minutos. Consultar al médico especialista.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
SAMU: 106  
CROP BUSINESS SAC: 349 - 2669 ANEXO: 1005

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido utilícelo la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para las abejas y artrópodos beneficios. No aplicar en época de floración
- Peligroso para organismos acuáticos.



# FORTAGE 350 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN: Imidacloprid ..... 350 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. POUA N° 431 SENASA  
Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C.

Impulsado y distribuido por:  
CROP BUSINESS S.A.C.



Av. Magareño N° 580 Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina  
Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación:  
N° de Lot:  
Contenido Neto: 250 ml  
Fecha de Vencimiento:

Formulado por:  
HONOR INDUSTRIAL CO. LTD  
30/F, Golden Center Tower N° 3037  
Jintan Road CBD Fudan, Shenzhen  
CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

FORTAGE 350 SC es un insecticida sistémico con actividad translinar que actúa por contacto e ingestión. FORTAGE 350 SC es un insecticida de amplio espectro, para el control de insectos succionadores en espárrago, pimiento, papa, mandarina, arroz y vid. FORTAGE 350 SC se prepara diluyendo la dosis en un cilindro con la mitad de agua, agitar bien y completar con agua al volumen total.

**"CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		
	Nombre Común	Nombre Científico	L/200 L	L/Ha	P.C (días) (ppm)
Espárrago	Mosquilla de los brotes	Prodoxipola longitza	0.2	0.5	7 0.05
Pimiento	Moaca blanca	Bemisia tabaci	0.2	0.5	7 1
Papa	Caracha (mosquilla de los brotes)	Prodoxipola longitza	0.2	0.6	14 0.5
Mandarina	Queresa coma	Lepidosaphes becki	0.14	0.7	30 1.0
Arroz	Cigarrita del virus de la hoja blanca	Tagonomus phycodactylus orizicola	0.2	0.2	30 1.5
Vid	Flozara	Vitaeus vitifoliae	0.1-0.15	-	30 1.0

P.C.: Período de carencia (días) L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: Partes por millón)

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Iniciar el tratamiento con FORTAGE 350 SC cuando el nivel de daño económico lo justifique luego de una previa evaluación del campo. Realizar hasta 3 aplicaciones por campaña/año en el cultivo de pimiento, papa y arroz. Para el caso de mandarina y vid son 2 aplicaciones por campaña/año.

**PERIODO DE REINGRESO:** Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

**FITOTOXICIDAD:** FORTAGE 350 SC no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se siguen las instrucciones señaladas en la etiqueta.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso frecuente. Es incompatible con productos de resaca alcalina, ácida u oxidante fuerte.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

0.7 cm

21.0 cm

0.5 cm

7.7 cm

1.20 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Moderadamente peligroso por inhalación.
- Moderadamente irritante a las vías respiratorias y tracto respiratorio.
- Moderadamente irritante a la piel, usar equipo de protección de la piel y cuerpo.
- Ligera irritante a los ojos, usar gafas protectoras.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante jabón
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo Químico: Neonicotinoide
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua durante 15 minutos y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón, durante 15 minutos. Consultar al médico especialista.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
SAMU: 106  
CROP BUSINESS SAC: 349 - 2669 ANEXO: 1005

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido utilícelo la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para las abejas y artrópodos beneficios. No aplicar en época de floración
- Peligroso para organismos acuáticos.



# FORTAGE 350 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - (SC)

COMPOSICIÓN:  
Imidacloprid ..... 350 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PDUJ N° 631 - SENASA  
Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C.

Registrado y Distribuido por:  
**CROP BUSINESS S.A.C.**



Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina  
Teléfono: 349-2669

Formulación:  
Líquido  
Contenido Neto: 250 ml  
Fecha de Vencimiento:

Formulado por:  
NANJING FENGSHAN CHEMICAL CO., LTD  
1504, Central International Mansion 105-6  
North Zhongshan Road, Nanjing  
CHINA

NO CORROSIVO      NO INFLAMABLE      NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

FORTAGE 350 SC es un insecticida sistémico con actividad translinar que actúa por contacto e ingestión. FORTAGE 350 SC es un insecticida de amplio espectro, para el control de insectos succionadores en espárrago, pimiento, papa, mandarina, arroz y vid. FORTAGE 350 SC se prepara diluyendo la dosis en un cilindro con la mitad de agua, agitar bien y completar con agua al volumen total.

**"CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		
	Nombre Común	Nombre Científico	L/200 L	L/Ha	P.C (días)
Espárrago	Mosquilla de los brotes	Prodoxipola longitza	0.2	0.5	7
Pimiento	Mosca blanca	Bemisia tabaci	0.2	0.5	7
Papa	Caracha (mosquilla de los brotes)	Prodoxipola longitza	0.2	0.6	14
Mandarina	Queresa coma	Lepidosaphes beckii	0.14	0.7	30
Arroz	Cigarrita del virus de la hoja blanca	Tagonomus phaeocolletus orizicola	0.2	0.2	30
Vid	Flozara	Vitaceus vitifoliae	0.1-0.15	-	30

P.C.: Período de carencia (días)      L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: Partes por millón)

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Iniciar el tratamiento con FORTAGE 350 SC cuando el nivel de daño económico lo justifique luego de una previa evaluación del campo. Realizar hasta 3 aplicaciones por campaña/año en el cultivo de pimiento, papa y arroz. Para el caso de mandarina y vid son 2 aplicaciones por campaña/año.

**PERIODO DE REINGRESO:** Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

**FITOTOXICIDAD:** FORTAGE 350 SC no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se siguen las instrucciones señaladas en la etiqueta.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso frecuente. Es incompatible con productos de resaca alcalina, ácida u oxidante fuerte.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

0.7 cm

21.0 cm

0.5 cm

7.7 cm

1.20 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Moderadamente peligroso por inhalación.
- Moderadamente irritante a las vías respiratorias y tracto respiratorio.
- Moderadamente irritante a la piel, usar equipo de protección de la piel y cuerpo.
- Ligera irritante a los ojos, usar gafas protectoras.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante jabón
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo Químico: Neonicotinoide
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua durante 15 minutos y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón, durante 15 minutos. Consultar al médico especialista.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
SAMU: 106  
CROP BUSINESS SAC: 349 - 2669 ANEXO: 1005

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inútilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para las abejas y artrópodos beneficios. No aplicar en época de floración
- Peligroso para organismos acuáticos.



# FORTAGE 350 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

SUSPENSION CONCENTRADA - (SC)

COMPOSICIÓN: Imidacloprid ..... 350 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. 1994 N° 831 - SENASA  
Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C.

Importado y Distribuido por:  
CROP BUSINESS S.A.C.



Av. Melgarejo N° 588 Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina  
Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación:  
N° de Lote:  
Contenido Neto: 250 ml  
Fecha de Vencimiento:

Formulado por:  
NANJING RHONGQUIM CO., LTD.  
N° 26 Maja Street, Nanjing, Jiangsu, 210009  
CHINA

NO CORROSIVO      NO INFLAMABLE      NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

FORTAGE 350 SC es un insecticida sistémico con actividad translinar que actúa por contacto e ingestión. FORTAGE 350 SC es un insecticida de amplio espectro, para el control de insectos succionadores en espárrago, pimiento, papa, mandarina, arroz y vid. FORTAGE 350 SC se prepara diluyendo la dosis en un cilindro con la mitad de agua, agitar bien y completar con agua al volumen total.

**"CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C (días)	P.C (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/200 L	L/Ha		
Espárrago	Mosquilla de los brotes	Prodoxipola longifila	0.2	0.5	7	0.05
Pimiento	Mosca blanca	Bemisia tabaci	0.2	0.5	7	1
Papa	Caracha (mosquilla de los brotes)	Prodoxipola longifila	0.2	0.6	14	0.5
Mandarina	Queresa coma	Lepidosaphes beckii	0.14	0.7	30	1.0
Arroz	Cigarrita del arroz de la raíz blanca	Tagonomia philippinensis orizivora	0.2	0.2	30	1.5
Vid	Flozara	Vitaeus vitifoliae	0.1-0.15	-	30	1.0

P.C.: Período de carencia (días)      L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: Partes por millón)

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Iniciar el tratamiento con FORTAGE 350 SC cuando el nivel de daño económico lo justifique luego de una previa evaluación del campo. Realizar hasta 3 aplicaciones por campaña/año en el cultivo de pimiento, papa y arroz. Para el caso de mandarina y vid son 2 aplicaciones por campaña/año.

**PERIODO DE REINGRESO:** Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

**FITOTOXICIDAD:** FORTAGE 350 SC no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se siguen las instrucciones señaladas en la etiqueta.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso frecuente. Es incompatible con productos de resaca alcalina, ácida u oxidante fuerte.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO SENASA

21.0 cm

0.7 cm

0.5 cm

7.7 cm

1.20 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Moderadamente peligroso por inhalación.
- Moderadamente irritante a las vías respiratorias y tracto respiratorio.
- Moderadamente irritante a la piel, usar equipo de protección de la piel y cuerpo.
- Ligera irritante a los ojos, usar gafas protectoras.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante jabón
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo Químico: Neonicotinoide
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua durante 15 minutos y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón, durante 15 minutos. Consultar al médico especialista.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
SAMU: 106  
CROP BUSINESS SAC: 349 - 2669 ANEXO: 1005

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido utilícelo la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para las abejas y artrópodos beneficios. No aplicar en época de floración
- Peligroso para organismos acuáticos.



# FORTAGE 350 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - (SC)

COMPOSICIÓN:  
Imidacloprid ..... 350 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 631 - SENASA  
Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C.

Importado y Distribuido por:  
CROP BUSINESS S.A.C.



Av. Melgarejo N° 500 Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina  
Teléfono: 349-2669

Formulado por:  
YIXING XINGNONG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD  
Wanshi Town, Yixing, Jiangsu Province  
CHINA

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**  
FORTAGE 350 SC es un insecticida sistémico con actividad translinar que actúa por contacto e ingestión.  
FORTAGE 350 SC es un insecticida de amplio espectro, para el control de insectos succionadores en espárrago, pimiento, papa, mandarina, arroz y vid.  
FORTAGE 350 SC se prepara diluyendo la dosis en un cilindro con la mitad de agua, agitar bien y completar con agua al volumen total.

**"CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C (días)	P.C (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/200 L	L/Ha		
Espárrago	Mosquilla de los brotes	Protoplasia longifila	0.2	0.5	7	0.05
Pimiento	Mosca blanca	Bemisia tabaci	0.2	0.5	7	1
Papa	Caracha (mosquilla de los brotes)	Protoplasia longifila	0.2	0.6	14	0.5
Mandarina	Quemasa común	Lepidosaphes baculi	0.14	0.7	30	1.0
Arroz	Cigarrita del virus de la hoja blanca	Tagonomus phycodactylus orizicola	0.2	0.2	30	1.5
Vid	Flozara	Vitaeus vitifoliae	0.1-0.15	-	30	1.0

P.C.: Período de carencia (días) L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: Partes por millón)

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Iniciar el tratamiento con FORTAGE 350 SC cuando el nivel de daño económico lo justifique luego de una previa evaluación del campo. Realizar hasta 3 aplicaciones por campaña/año en el cultivo de pimiento, papa y arroz. Para el caso de mandarina y vid son 2 aplicaciones por campaña/año.

**PERIODO DE REINGRESO:** Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

**FITOTOXICIDAD:** FORTAGE 350 SC no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se siguen las instrucciones señaladas en la etiqueta.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso frecuente. Es incompatible con productos de rescisión alcalina, ácida u oxidante fuerte.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

0.7 cm

21.0 cm

0.5 cm

7.7 cm

1.20 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Moderadamente peligroso por inhalación.
- Moderadamente irritante a las vías respiratorias y tracto respiratorio.
- Moderadamente irritante a la piel, usar equipo de protección de la piel y cuerpo.
- Ligera irritante a los ojos, usar gafas protectoras.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante jabón
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo Químico: Neonicotinoide
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua durante 15 minutos y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón, durante 15 minutos. Consultar al médico especialista.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
SAMU: 106  
CROP BUSINESS SAC: 349 - 2669 ANEXO: 1005

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido utilícelo la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para las abejas y artrópodos beneficios. No aplicar en época de floración
- Peligroso para organismos acuáticos.



# FORTAGE 350 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSION CONCENTRADA - (SC)

COMPOSICIÓN: Imidacloprid ..... 350 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. QUA N° 631 - SENASA  
Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C.  
Importado y Distribuido por:  
CROP BUSINESS S.A.C.



Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina  
Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación:  
N° de lote:  
Contenido Neto: 250 ml  
Fecha de Vencimiento:

Formulado por:  
SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD  
N° 23, Lane 5388, Shenzhuan Road  
Songjiang District, Shanghai  
CHINA

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

FORTAGE 350 SC es un insecticida sistémico con actividad translinar que actúa por contacto e ingestión. FORTAGE 350 SC es un insecticida de amplio espectro, para el control de insectos succionadores en espárrago, pimiento, papa, mandarina, arroz y vid. FORTAGE 350 SC se prepara diluyendo la dosis en un cilindro con la mitad de agua, agitar bien y completar con agua al volumen total.

**"CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C (días)	P.C (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/200 L	L/Ha		
Espárrago	Mosquilla de los brotes	Prodoxipola longitarsis	0.2	0.5	7	0.05
Pimiento	Mosca blanca	Bemisia tabaci	0.2	0.5	7	1
Papa	Caracha (mosquilla de los brotes)	Prodoxipola longitarsis	0.2	0.6	14	0.5
Mandarina	Queresa como	Lepidosaphes beckeri	0.14	0.7	30	1.0
Arroz	Cigarrita del arroz de la rosa blanca	Tagaonius philippinensis orizivorus	0.2	0.2	30	1.5
Vid	Flozara	Vitaeus vitifoliae	0.1-0.15	-	30	1.0

P.C.: Período de carencia (días) L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: Partes por millón)

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Iniciar el tratamiento con FORTAGE 350 SC cuando el nivel de daño económico lo justifique luego de una previa evaluación del campo. Realizar hasta 3 aplicaciones por campaña/año en el cultivo de pimiento, papa y arroz. Para el caso de mandarina y vid son 2 aplicaciones por campaña/año.

**PERIODO DE REINGRESO:** Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

**FITOTOXICIDAD:** FORTAGE 350 SC no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se siguen las instrucciones señaladas en la etiqueta.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso frecuente. Es incompatible con productos de resaca alcalina, ácido u oxidante fuerte.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA