4.3 cm

27.8 cm

23.5cm

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

CAPATAZ®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición Química:

Mancozeb..... 640 g/kg
Cymoxanil..... 80 g/kg
Aditivos..... c.s.p 1 kg

Reg. PQUA N° 497 - SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:

AgroKlinge
A member of ADAMA

AGRO KLINGE S.A.
Av. El Derby N° 254, Int. 306. Santiago de Surco.
Lima - Perú. Telf: (01) 641-0000

Formulado por:
Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd
6TH Floor, Gaoxinjishuchuangye
Centre, Shunhua Road 750#,
Jinan, Shandong, China

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Fecha de vencimiento:

Contenido Neto: 500 g

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

1 cm

1 cm

1 cm

17 cm

21cm

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DE SENASA

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Cuidado evite el contacto. PROBABLE CARCINÓGENO.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en lugares secos y ventilados, lejos del calor.
- Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y ventilado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Acetamida+ Dithiocarbamato.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele una copia de esta etiqueta.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106; AGRO KLINGE S.A.: (01)641-0000.
ATENCIÓN AL CLIENTE: AGRO KLINGE S.A.: (01) 641-0000.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de aplicación de no aplicación hacía cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: CAPATAZ es un fungicida de contacto y sistémico, con acción preventiva y curativa para el control de enfermedades producidas por patógenos de la orden peronosporales, tales como la “Rancha”.

CAPATAZ se aplica en pulverizaciones foliares, previa mezcla con agua con equipos de aspersión terrestre.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R (ppm)	
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/ha	kg/200 L		Mancozeb	Cymoxanil
PAPA	“Rancha”	*Phytophthora infestans*	1 - 2	0.5 - 1	14	0.3	0.05
VID	“Mildiu”	*Plasmopara viticola*	2	0.33	7	1.5	0.10

P.C.= Período de carencia / L.M.R.= Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar como máximo dos (02) aplicaciones por campaña para el cultivo de papa, con un intervalo de aplicación entre 7 a 14 días. Y una (01) aplicación para el cultivo de vid, considerando una (01) campaña por año para ambos cultivos.

Momento de aplicación recomendado:
Realizar la aplicación cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones climáticas favorezcan el desarrollo de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada antes de las 24 horas.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos".

COMPATIBILIDAD: Incompatible con los plaguicidas de reacción alcalina y los compuestos a base de cobre. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto " .

® Marca Registrada



4.3 cm
27.8 cm
23.5cm
1 cm
2 cm
2 cm
17 cm
21cm