

# FOLPAN<sup>®</sup> 50 PM

## FUNGICIDA AGRÍCOLA

### POLVO MOJABLE (WP)

#### Composición Química:

Folpet ..... 500 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

Reg N° 348-97-AG-SENASA

Titular del Registro:  
  
**Proficol**  
PROFIANDINA PERÚ S.A.  
Calle Mártir Olaya N° 169. Of. 705. Miraflores.  
Lima - Perú. Telf.: (01) 641-0000.

Formulado por:  
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD  
Beer Sheva 84100. Israel.

Importado y Distribuido por :  
PROFIANDINA PERÚ S.A.

Lote N°

CONTENIDO NETO: 1KILOGRAMO

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO**

**CUIDADO**

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTENGA EL PRODUCTO BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto causa daño temporal a los ojos.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua de consumo.
- Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar el producto en lugares frescos y ventilados, lejos de la pared y sobre una parihuela.
- No almacenar el producto en casas de habitación.
- Utilizar equipo de protección durante la mezcla y aplicación y para re-ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No re-ensasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- En caso de presentarse síntomas de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta
  - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos. Si el dolor persiste consultar con un oftalmólogo.
  - En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar toda la zona expuesta al producto con jabón suave y agua; a continuación enjuague con agua tibia. Consulte a un médico en caso de cualquier complicación.
  - En caso de ingestión, no induzca al vómito. Lavar la boca con agua abundante. No administre nada oralmente si el paciente esta inconscientes. Consulte a un médico.
- En caso de inhalación, sacar a la víctima al aire libre y mantenerla abrigada y en reposo. Si se ha producido paro respiratorio dar respiración artificial. Si la respiración es dificultosa dar oxígeno. Llamar al médico.

**NOTA AL MÉDICO:**

Se desconoce antídoto específico. Tratamiento sintomático y terapia complementaria. En caso de ingestión hacer lavado gástrico y administrar carbono activado.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA (líneas gratuitas)**  
**CISPROQUIM: 080-050-847**  
**CICOTOX : 0800- 1-3040**  
**INFOSALUD: 0800-10-828**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para animales domésticos, flora y fauna silvestre.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos vacíos
- No aplicar a menos de 5 m de las fuentes de agua en los cultivos anuales recomendados y no menos de 10 m en el cultivo de vid.
- No lavar el equipo ni la ropa utilizada en la aplicación de **FOLPAN 50 PM** en lugares cercanos a fuentes de agua.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o los sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**FOLPAN 50 PM** es un fungicida no sistémico de amplio espectro de acción, que se utiliza en aplicaciones preventivas para el control de patógenos foliares, de flores y de frutos. Debido a que este producto actúa sobre varios sitios de acción en el hongo, la probabilidad de aparición de resistencia es baja. El ingrediente activo de **FOLPAN 50 PM** se degrada rápidamente en el medio ambiente no dejando residuos tóxicos.

Preparar una pre-mezcla diluyendo la dosis recomendada en un recipiente con agua, llevar esta solución al cilindro o mochila según sea el caso y completar con agua hasta alcanzar el volumen requerido, agitar continuamente y proceder a la aplicación.

**FOLPAN 50 PM** se aplica con cualquier equipo de pulverización terrestre de mochila a palanca o motor, o con dispositivos adaptados al tractor. Calibrar los equipos para evitar sobre o sub-dosificaciones. Realizar la aplicación con gotas finas y cobertura uniforme.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

**Cuadro de Usos**

| CULTIVO  | ENFERMEDAD  | DOSIS     |           | P.C.<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|----------|---|-----------|-----------|----------------|--------------|
|          |   | Kg/200 L  | Kg/ha     |                |              |
| CEBOLLA  | “Mildiu”<br><i>Peronospora destructor</i>               | 0.5       | 1.0 - 1.5 | 7              | 2            |
|          | “Oidium”<br><i>Erysiphe malachrae</i>                   | 0.5 - 1.0 | 1.0 - 2.0 | -              | -            |
| MARIGOLD | “Mancha negra”<br><i>Alternaria solani</i>              | 0.5       | 1.0 - 1.5 | 7              | -            |
| PAPA     | “Hielo fungoso/rancha”<br><i>Phytophthora infestans</i> | 1.0       | 2.0 - 3.0 | 7              | 5            |
|          | “Mancha negra”<br><i>Alternaria solani</i>              |           |           |                |              |
| TOMATE   | “Mancha negra”<br><i>Alternaria solani</i>              | 0.5       | 1.0 - 1.5 | 7              | 5            |
|          | “Podredumbre gris”<br><i>Botrytis cinerea</i>           | 0.5       | 1.0 - 2.0 |                |              |
| VID      | “Podredumbre gris”<br><i>Botrytis cinerea</i>           | 0.5 - 1.0 | 1.5 - 2.0 | 7              | 25           |
| ZAPALLO  | “Oidium”<br><i>Erysiphe cichoracearum</i>               | 0.5 - 1.0 | 1.0 - 1.5 | 7              | 2            |

P.C.: Periodo de Carencia      LMR: Límite Máximo de Residuos

**FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:**

Realizar como máximo 3 aplicaciones por campaña con un intervalo mínimo entre aplicaciones de 7 días. Las aplicaciones deben realizarse de forma preventiva, antes de la aparición de los síntomas de la enfermedad, cuando las condiciones climáticas favorezcan su desarrollo.

**PERIODO DE REINGRESO:**

No reingresar al área tratada, sin ropa de protección, durante 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

Compatible con la mayoría de plaguicidas agrícolas de uso común, salvo aquellos fuertemente alcalinos. No se debe emplear en combinación con aceite o poco después de la aspersión de aceite.

**FITOTOXICIDAD:**

No se han observado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos y dosis recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

