LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.
- No comer beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas, forraje.
- Utilizar ropa protectora, guantes botas y máscara durante el manipuleo y aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento en horas de baja insolación y viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Phenylurea.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de inhalación lleve a la víctima al aire libre, brindar respiración artificial si es necesario. Acuda a un médico.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca manteniendo el párpado bien abierto por lo menos 15 minutos, acuda a un médico. Si el contacto fuese con la piel retírese la ropa contaminada y lavese con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, lavar la boca con abundante agua. Acuda a un médico. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

NOTA AL MÉDICO: En caso de ingestión, efectuar lavado estomacal. Proseguir con un purgante alcalino. Tratar los síntomas y brindar terapia necesaria.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA (líneas gratuitas)
CISPROQUIM: 080-050-847
CICOTOX : 0800- 1-3040
INFOSALUD: 0800-10-828

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No utilizar el envase para conservar alimentos o agua potable.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame absorber el producto con arena u otro material inerte y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

COTTONEX®
50 SC

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición química:

Fluometuron.....	500 g/L
Aditivos	c.s.p 1 L

Reg N°: 661-98-AG-SENASA

Titular del Registro:
PROFIANDINA PERÚ S.A.
Calle Mártir Olaya N° 169. Of. 705. Miraflores .
Lima - Perú. Telf.: (01) 255-7190.

Formulado por:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
Northern Industrial Zone
Ashdod 77102, Israel

Importado y Distribuido por:
PROFIANDINA PERÚ S.A.

Contenido neto:

Lote N°
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
COTTONEX® 50 SC es un herbicida selectivo a base de fluometuron, de buen poder residual, recomendado para el control de malezas de hoja ancha y algunas gramíneas en los cultivos de algodón, caña de azúcar y sorgo.
Cuando se aplica a plántulas jóvenes de malezas es absorbido principalmente por el sistema radicular y en menor medida por las hojas.
Aunque **COTTONEX® 50 SC** es un herbicida selectivo, se recomienda hacer las aplicaciones dirigidas directamente sobre las malezas, evitando el contacto con el cultivo, sobre todo en estado de plántula.

SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN
Agitar el envase antes de preparar la suspensión. Llenar el tanque del equipo de aplicación a la mitad, preparar una pre-mezcla en un balde de agua e incorporarla al tanque de aplicación, luego adicionar agua hasta completar el volumen requerido. Durante la preparación de la mezcla y aplicación del producto mantener en marcha el sistema de agitación. **COTTONEX® 50 SC** puede ser aplicado con pulverizadoras de mochila o con equipos montados a tractor, utilizando un volumen de agua de 200 - 400 litros por hectárea. Utilizar boquillas de abanico plano.
Para obtener una actividad herbicida completa y facilitar la absorción del producto por las raíces es necesaria la presencia de humedad en el suelo, por lo que se debe aplicar durante la estación de lluvias o antes del riego .

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS (L/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
ALGODONERO	Yuyo	*Amaranthus spp.*	1.60	60	0.1
	Amor seco	*Bidens pilosa*			
	Moco de pavo	*Echinocloa spp.*			
	Pata de gallina	*Eleusine indica*			
	Lechera	*Euphorbia spp.*			
	Verdolaga	*Portulaca oleracea*			
	Rabo de zorro	*Setaria verticillata*			
CAÑA DE AZÚCAR	Yuyo	*Amaranthus spp.*	1.12	180	0.05
	Amor seco	*Bidens pilosa*			
	Moco de pavo	*Echinocloa spp.*			
	Pata de gallina	*Eleusine indica*			
	Lechera	*Euphorbia spp.*			
	Verdolaga	*Portulaca oleracea*			
	Rabo de zorro	*Setaria verticillata*			
SORGO	Yuyo	*Amaranthus spp.*	0.70	N.D.	0.05
	Amor seco	*Bidens pilosa*			
	Moco de pavo	*Echinocloa spp.*			
	Pata de gallina	*Eleusine indica*			
	Lechera	*Euphorbia spp.*			
	Verdolaga	*Portulaca oleracea*			
	Rabo de zorro	*Setaria verticillata*			

P.C.: Periodo de Carencia LMR : Límite Máximo de Residuos N.D. : No disponible

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
N° máximo de aplicaciones por campaña: 2
Intervalo mínimo entre aplicaciones: 20 días
En pre-emergencia,despues de la siembra antes que emerja las malezas
En post-emergencia temprana, tratamiento dirigido cuando el cultivo alcance 15-20 cm y con malezas menores de 5 cm.

PERIODO DE REINGRESO
Se puede reingresar al área tratada, sin ropa de protección, después de 24 horas de haber aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD
COTTONEX® 50 SC puede ser aplicado en mezcla con otros herbicidas excepto aquellos con marcada reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD
Siendo herbicida, este producto es fitotoxico para la mayoría de vegetales, ya sean dañinos o útiles, exceptuando los cultivos para los cuales se recomienda siempre y cuando se observen las instrucciones de uso antes expuestas.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO