

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en un lugar seco, bien ventilado y cerrado bajo techo.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada, en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Aminofosfonato.

- **En caso de contacto con los ojos:** lavar con abundante agua fresca durante 15 minutos, y si el contacto fuese con la piel, retirar la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- **En caso de ingestión:** induzca al paciente al vómito y realizar lavado gástrico.
- **En caso de inhalación:** sacar a la persona del área contaminada y proporcionar aire fresco.
- **En caso de intoxicación:** llamar a un médico inmediatamente, o trasladar al paciente al centro médico más cercano.

NOTA AL MÉDICO: No tiene antídoto específico. Todo tratamiento deberá ser sintomático.

Teléfonos de emergencia

CETOX: 0800-71911

ESSALUD: 411-8000 (opción 4)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los animales domésticos; fauna y flora silvestre.
- Peligroso para peces no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para ese fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Quimifosato®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

Composición:

Glyphosate 480 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Reg. N°423-97-AG-SENASA

Distribuido por:



QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.



Contenido Neto: 1 L

Formulado por:

SERFI S.A.
Av. República de Panamá 2577
La Victoria, Lima - Perú
Telef.: 710-4000

Titular del Registro:

QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.
Av. República de Panamá 2577.
La Victoria, Lima-Perú
Telef.: 710-4000

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

GENERALIDADES

QUIMIFOSATO es un herbicida sistémico, no selectivo para el control de todo tipo de malezas, tanto anuales como perennes. Se usa únicamente en post-emergencia, ya que penetra rápidamente por el follaje (3 a 4 horas).

QUIMIFOSATO al ser aplicado sobre malezas, se transloca a sus estructuras de conservación (estolones, rizomas, bulbos, etc.) obteniéndose un excelente control.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

QUIMIFOSATO requiere que las malezas se encuentren en plena actividad fisiológica (suelo húmedo) para favorecer la absorción y translocación del producto dentro de la planta.

QUIMIFOSATO se usa en pulverización sobre el follaje. Para preparar la solución de aplicación se deberá realizar previamente una pre-mezcla colocando agua en un envase, luego vaciar la pre-mezcla en el equipo de aplicación, agregar la cantidad de agua que se va a usar y agitar. Es necesario calibrar el equipo de aplicación, así como el volumen de agua. Mojar bien el follaje para lograr una mejor efectividad y mayor rapidez de acción.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVOS	MALEZAS		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Frutales. Caña de Azúcar, Té, Café, Plátano	Grama China	<i>Sorghum halepense</i>	2-3	N/A	0.1
	Kikuyo	<i>Pennisetum sp.</i>			
	Gramalote	<i>Panicum purpurascens</i>			
	Grama dulce	<i>Cynodon dactylon</i>			
	Coquillo	<i>Cyperus sp.</i>			
Espárrago	Grama dulce	<i>Cynodon dactylon</i>	2-3	N/A	0.1
	Coquito	<i>Cyperus esculentus</i>	2-3	N/A	0.1
Palto	Coquito	<i>Cyperus esculentus</i>	2-3	N/A	0.1
	Grama dulce	<i>Cynodon dactylon</i>	2-3	N/A	0.1
Mandarina	Coquito	<i>Cyperus esculentus</i>	2-3	N/A	0.1

PC: Período de Carenacia

LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

QUIMIFOSATO debe ser aplicado en post emergencia, cuando las malezas tengan de 3 a 4 hojas. Es aconsejable, para la toma de decisión del correcto momento de aplicación, monitorear el estado de las malezas. Realizar un máximo de 1 aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas hasta 48 después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de productos pre y post emergentes de maleza; a excepción de ácidos y bases.

FITOTOXICIDAD

Por ser un herbicida no selectivo, es fitotóxico a todas las especies de plantas. Aplicar el producto antes de la siembra de los cultivos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

