

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR
EL PRODUCTO**
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE
USO Y APLICACIÓN:**

Evite su contacto con la piel y prolongada inhalación, use máscaras y guantes protectores.

Durante el manipuleo del producto, no comer, no beber ni fumar.

Terminadas las labores, deben lavarse con agua y jabón principalmente las partes expuestas al producto, cambiarse de ropa y luego bañarse.

No transporte ni almacene este producto junto con comestibles, bebidas o medicinas de uso humano.

Evite la contaminación de alimentos y medicinas para uso humano y animal.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación por ingestión, provoque el vómito introduciendo el dedo en la garganta o administrando un vaso de agua tibia salada. Lleve al paciente con el médico y muéstrela la etiqueta. Si el paciente está inconsciente mantenerlo en posición de reposo, no inducir al vómito, acuda al médico.

ANTÍDOTO:

Tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO
DE INTOXICACIÓN:**

CICOTOX: 0800-1-3040
CISPROQUIM: 0800-50847

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS
Y ENVASES VACÍOS:**

"Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases".

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques. Aplique el producto como se indica en la etiqueta, no reutilice los envases, destrúyalos. Peligroso para los animales domésticos, flora y fauna silvestre.



FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Fosetil AI, 800 g/kg
Aditivos, csp 1 kg

Reg. N° 309-96-AG-SENASA

Titular del Registro:

Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 10, San Isidro

Formulado por:

Bayer S.A.
Av. Américas 57-52
Bogotá D.C. - Colombia

Importado y distribuido por:

Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
San Isidro, Lima - Perú
Telf. 211-3800

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE
NO EXPLOSIVO**

**Contenido
Neto: 10 kilos**

Lote N°
Fecha de
Formulación:
Fecha de
Vencimiento:



© = Marca Registrada del grupo Bayer

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

ALLETTE es un fungicida de sistemicidad completa, ascendente y descendente. Pertenece al grupo del ácido fosfónico. Muy activo principalmente sobre los hongos que pertenecen a la familia de los Ficomycetos (*Mildius*, *Phytophthora* y *Phythium*).

Posee una rápida penetración y una larga persistencia en el interior de la planta. ALLETTE es absorbido por la planta en menos de 30 minutos y es transportado por la savia hasta las raíces y rebrotes que se forman después de la aplicación.

ALLETTE debe utilizarse tanto en tratamiento preventivo como en tratamiento curativo precoz y las plantas deben estar en plena actividad para aprovechar la acción sistémica del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

USOS ESPECÍFICOS:

CULTIVOS	ENFERMEDADES		DOSIS (g / 200 L)	DOSIS (kg / Ha)	P.C.* (días)	L.M.R. **(ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO				
NARANJO LIMÓN	Gomosis de los cítricos	<i>Phytophthora spp</i>	500	-	14	5
PALTO	Tristeza	<i>Phytophthora spp</i>	500	-	14	1
PEPINILLO SANDIA MELÓN	Mildiú	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	750	-	7	3
CEBOLLA AJO	Mildiú	<i>Peronospora destructor</i>	750	-	7	2
ROSA	Mildiu	<i>Peronospora sparsa</i>	500	-	7	-
PIMIENTO	Phytophthora	<i>Phytophthora capsici</i>	-	1,5 - 2	15	130
VID	Plasmopara	<i>Plasmopara viticola</i>	500	2,5	15	10

* PC = Periodo de carencia (en días) ** LMR = Limite máximo de residuos (en ppm)

FORMA DE APLICACIÓN:

TRATAMIENTO AL FOLLAJE: Utilizar volúmenes de agua que aseguran un buen cubrimiento de hojas, ramas y frutos.

TRATAMIENTO DE CIRUGÍA EN ÁRBOLES: A nivel del tronco (curación de chancros y heridas), aplicar ALLETTE formando una pasta concentrada sobre el tronco previamente raspado hasta tejido sano: 500 g/Litro de agua.

MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

En árboles frutales aplicar con intervalos de 60 a 90 días y en otros cultivos cada 20 días. En el cultivo de vid se recomienda realizar dos aplicaciones por campaña, al inicio de la infección y luego previa evaluación del campo.

FITOTOXICIDAD:

Tiene muy buena fitocompatibilidad en los cultivos recomendados siguiendo las indicaciones y dosis establecidas.

INCOMPATIBILIDAD:

Es compatible con los plaguicidas más comunes.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



PRIMER PDF
Ref. Sticker 10 kilos
Producto: Aliette
País: PERÚ
Fecha: Agosto 6 de 2012
Tamaño: 250 mm x 225 mm

TINTAS CMYK (4)
Cian Negro
Magenta Amarillo

Holograma
Securalic
Lilac-Green