

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación; y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Moderadamente tóxico para los peces.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingerir accidentalmente el producto, provocar el vómito y si no, administre jarabe de ipecacuana, una cucharada (15 mL) seguida de 1 ó 2 vasos de agua. No induzca al vómito ni administre nada oralmente a una persona inconsciente.
- En caso de inhalación, traslade a la persona a un lugar ventilado o un área no contaminada.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavar con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con la piel, quite la ropa contaminada. Lave inmediatamente con abundante agua y jabón.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA (líneas gratuitas)
CISPROQUIM: 080-050-847
INFOSALUD: 0800-10-828
CICOTOX : 0800- 13040

NOTA AL MÉDICO:

Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico, por lo que el tratamiento es sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo ó perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
 Peligroso para peces.
 No contaminar las fuentes de agua, lagos, ríos, estanques, arroyos y drenajes con los desechos y envases vacíos.

ORIOUS® 25 EW

FUNGICIDA AGRÍCOLA
EMULSIÓN ACEITE EN AGUA (EW)

Composicion Química:

Tebuconazole..... 250 g/L
 Aditivos c.s.p 1L

Reg N°: 907-99-AG-SENASA

Titular del Registro :

PROFIANDINA PERÚ S.A.
 Calle Maritir Olaya N° 169. Of. 705. Miraflores.
 Lima - Perú. Telf.: (01) 255-7190.

Formulado por:
PROFICOL ANDINA
B.V. SUCURSAL COLOMBIA
 Calle 1 C N° 7-53 Interior Zona Franca.
 Barranquilla - Colombia

Importado y Distribuido por:
PROFIANDINA PERÚ S.A.

CONTENIDO NETO: 1 LITRO

Lote N°
 Fecha Fabricación:
 Fecha Vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ORIOUS® 25 EW es un fungicida de amplio espectro de acción formulado en base de un compuesto triazol el cual actúa inhibiendo la biosíntesis de esteroides en los hongos. Por su actividad sistémica penetra rápidamente a los tejidos foliares afectando el desarrollo del hongo antes que se presenten los síntomas de la enfermedad y cuando estos ya son visibles.

ORIOUS®25 EW se aplica en pulverización al follaje con equipo de mochila manual o motorizado, o aguilón montado a tractor, debiendo emplearse suficiente cantidad de agua para lograr una buena cobertura del follaje. Llenar el tanque del equipo de aplicación a la mitad, preparar una pre-mezcla a parte e incorporarla al tanque, luego adicionar agua hasta completar el volumen requerido. Durante la preparación de la mezcla y aplicación mantener en marcha el sistema de agitación.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO
CUADRO DE USOS ESPECÍFICOS DEL PRODUCTO**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS ml/ Cil 200 L	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
ARROZ	Quemado	<i>Pyricularia oryzae</i>	400 - 600	14	-
ESPARRAGO	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	400 - 600	7	0.05
	Cercosporiosis	<i>Cercospora asparagi</i>	150		
MANDARINA	Botrytis o Pudrición de frutos	<i>Botrytis cinerea</i>	200	14	-
MANGO	Oidium	<i>Oidium mangiferae</i>	50	7	-
MARIGOLD	Alternariosis o mancha foliar	<i>Alternaria solani</i>	200	14	-
TOMATE	Botrytis o Pudrición de frutos	<i>Botrytis cinerea</i>	200	10	-
VID	Oidium	<i>Uncinula necator</i>	60-100	21	0.2

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Iniciar las aplicaciones al observar los primeros síntomas de la enfermedad. En caso de infecciones medianas repetir la aplicación cada 14 días.

PERIODO DE REINGRESO

Se podrá reingresar al área tratada, 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas y coadyuvantes de uso común a excepción de los materiales fuertemente alcalinos.

FITOTOXICIDAD

No se ha registrado efectos fitotóxicos cuando se usa a la dosis y volúmenes de aplicación recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El **Titular del Registro** garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

