"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
-Este producto es dañino. No ingerir.
-Causa irritación moderada a los ojos.
-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
-Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco.
-Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
-Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos.
PRIMEROS AUXILIOS:
-Grupo químico: Piretroide
-En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
-Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
-En caso de contacto con los ojos levantar los párpados, lavarlos con abundante agua y retirar los lentes de contacto si los tuviera.
-En caso de contacto con la piel retirar la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
-En caso de inhalación trasladar al afectado al aire libre y si es necesario aplicar respiración artificial.
-En caso de ingestión no inducir al vómito ni dar nada por vía oral a una persona que se encuentre inconsciente.
-En caso de emergencia llamar a:

CICOTOX: 0800-1-3040 (atención las 24 horas)
ó ESSALUD EN LINEA: 0801-10200 ó CISPROQUIM: 080-050-847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
-Después de usar el contenido, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
-Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
-Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
-Peligroso para las abejas y otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
-No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
-Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes.
-Peligroso para organismos acuáticos.
-No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
-No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
-Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
-El producto no debe aplicarse en zonas de napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
-Evitar que la deriva de aplicación alcance cultivos no objetivos.
-En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

L´BAMBORÉ-AG

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Cypermethrin.....250 g/L
Naphtha.....640 g/L
Aditivos.....csp 1 L

Registro PQUA N° 637- SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

ESDRAS ANTONIO GÓMEZ CARDONA
Mz. 3 - Lt. 8 - Jardines del Golf, Urb. Monserrate III, Víctor Larco Herrera
Trujillo, La Libertad, Perú - Telf.: 044-289877 - Nextel: 831*5780
ventas@agrynova.com

FABRICANTE Y FORMULADOR:

SHANGHAI AGRYNOVA CO., LTD
Room 2105. QD 3102 Trend Centre 29 - 31 Chung Lee Street
Chai Wan, Hong Kong, China. Telf 0085-229-738324

IMPORTADOR:

ESDRAS ANTONIO GÓMEZ CARDONA
Mz. 3 - Lt. 8 - Jardines del Golf, Urb. Monserrate III, Víctor Larco Herrera
Trujillo, La Libertad, Perú - Telf.: 044-289877 - Nextel: 831*5780
ventas@agrynova.com

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido neto : **200 L**
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO **INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

L´BAMBORÉ-AG, es un insecticida que actúa por contacto. El producto es absorbido a través del exoesqueleto quitinoso de insectos, tras el cual estimula el sistema nervioso central bloqueando la transmisión de los impulsos nerviosos y paralizando a los insectos causando su muerte.

"CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USO Y DOSIS

Cultivo	Plaga		Dosis		PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	L/Ha	L/200L		
Espárrago	Copitarsia	*Copitarsia decolora*	0.4 - 0.6	0.2 - 0.3	15	0.1

PC: Período de carencia en días
LMR: Límite máximo de residuos en ppm

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Realizar como máximo una aplicación por campaña, considerando dos campañas por año. Aplicar cuando se observe presencia de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO
Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas las 48 horas.

COMPATIBILIDAD
L´BAMBORÉ-AG es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas de uso común a excepción de aquellos de reacción alcalina. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD
El producto no es fitotóxico, si se usa de acuerdo a las dosis e indicaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las indicaciones e instrucciones dadas.

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO