

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

ITAMYL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA


INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE - SP

COMPOSICIÓN:
Methomyl 900 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 643 - SENASA
VENTA CON PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO

Grupo Químico :
Carbamatos
Nombre Químico :
N-(metilcarbamiloxy) tioacetimidato de S-metilo
Formula Empírica:
C₇ H₁₀ N₂ O₃S
Peso Molecular :
162.2101 g/mol
Formula Estructural:



NO CORROSIVO
INFLAMABLE
NO EXPLOSIVO

**ALTAMENTE PELIGROSO
TÓXICO**

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico: Polvo blanquecino.
Color: Blanco
Olor: Ligeramente sulfuroso
Densidad: 1.06 g/ml a 20°C
Inflamabilidad: Inflamable
Explosividad: No explosivo
Corrosividad: No corrosivo

PRESENTACIONES COMERCIALES:
100g, 1kg.

Titular de Registro, Importador y
Distribuido por:



Formulado por: SINOCHAM AGRO COMPANY LIMITED
17-19 1th Fl., N°33 He Nan Road (S)
Shanghai 200002, P. R. China

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en épocas de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrante del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos fauna y flora silvestre. No permitir a animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la bolsa cortándola, entreguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Carbamatos
- En caso de intoxicación, llamar al médico. Provocar el vómito si está consciente y luego aplicar tratamiento sintomático y de sostén. Al contacto con la piel y los ojos, lavarlos rápidamente con abundante agua limpia y jabón.

Teléfonos de emergencia:

SAMU: 106
ITAGRO S.A.: Teléf: +51 349-6805



LEA LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es nocivo por ingestión.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo o aspersión.
- El producto causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice el equipo de protección durante el manipuleo, mezcla y aplicación.
- El periodo de reingreso es de 48 horas, no ingresar antes sin equipo de protección, no permitir el ingreso de niños, personas en general ni animales domésticos al área tratada.
- No almacenar en casa habitación, ni cerca de alimentos ni medicinas.
- Almacenarlo en un lugar ventilado, bajo sombra, alejado de fuentes de calor.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

ITAMYL es un insecticida que actúa por contacto e ingestión sobre una amplia variedad de insectos. Tiene actividad sistémica.

Disuélvase la bolsa hidrosoluble en un tercio del agua a utilizar, agitar bien, luego añadir más agua hasta completar el volumen final; agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

ITAMYL se aplica con cualquier equipo de pulverización convencional terrestre utilizando boquillas de cono hueco o lleno o las indicadas para insecticidas que produzcan gotas finas. Antes de iniciar la aplicación, verificar que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento, sin fugas y correctamente calibrado.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y ROPA DE PROTECCIÓN

Para preparar la mezcla, utilizar guantes y botas de goma, delantal, tapabocas y careta de protección. Durante la aplicación, utilizar guantes y botas de goma, overol, máscara o respirador, gafas y gorro.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Deberá ser determinado por una persona capacitada quien deberá tomar en consideración aspectos como la incidencia de la plaga.

Aplicar ITAMYL (Methomyl) máximo 01 aplicación por campaña / año, cuando se observe la presencia de síntomas de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO:

Reingresar al área tratada después de 48 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD:

ITAMYL es compatible con otros plaguicidas de uso común, excepto con materiales fuertemente alcalinos.

FITOTOXICIDAD:

No se han observado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

USOS Y DOSIS:

CULTIVO	Plaga		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	Kg/200L	Kg/Ha		
Vid	"Trips"	<i>Thrips tabaci</i>	0.1-0.2	0.2-0.4	4	0.3
Espárrago	"Trips"	<i>Thrips tabaci</i>	0.2	0.52	5	2.0

P.C.: Periodo de Carenia
L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

