

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es de cuidado no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar en un lugar seco y bien ventilado, lejos de la casa-habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para el consumo.
- Realice la aplicación siguiendola dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**Grupo Químico: Cúprico**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente a un Centro Médico más cercano, mostrándole la etiqueta.
- Si se produce el contacto con los ojos lave con abundante agua por lo menos 15 minutos, también bajo los párpados, y acudir inmediatamente al médico.
- En caso de contaminación de la piel, retirar toda la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón, retirar al afectado de la zona tratada.
- En caso de inhalación apartar al paciente del lugar de exposición mantenerlo caliente y en reposo. Controle la respiración y si fuera necesario brindar respiración artificial.
- En caso de ingestión: inducir al vomito. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente, obtener asistencia médica o trasladar al paciente a un centro médico.

**Teléfonos de emergencia:**

**CICOTOX:** 0800-13040 ó 328 7398; Centro Nacional de Emergencias de ESSALUD: 0801-10200  
**CISPROQUIM:** 0800-50847; **ITAGRO S.A.:** (01) 349-6805

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Altamente peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia aguas corrientes de al menos 5 cm.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. no permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear las medidas de bioseguridad para controlar la deriva.
- En caso de derrame de este producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

# FLOXIL<sup>cu</sup>

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO SOLUBLE (SL)**

**Composición:**

Sulfato de cobre pentahidratado: 250 g/l  
 Aditivos: CSP L

**Reg. PQUA N° 642 - SENASA**

**Titular del registro:**

INDUSTRIA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A.

**Importado y Distribuido por:**



INDUSTRIA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A.  
 Av. Javier Prado Este Nro. 6210 Int. 201  
 (Edificio Park Office la Molina), La Molina  
 Lima - Perú. Tel. 349 6805

**Formulado por:**



San Pedro de Poás S/N, Ajuetza  
 Tilar-2448-4491 - Tlf: 2448-5198  
 Costa Rica

**Contenido neto** : 1 Litro  
**Lote N°** :  
**Fecha de formulación** :  
**Fecha de vencimiento** :

**NO CORROSIVO**      **NO INFLAMABLE**      **NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**Floxil cu** es un fungicida sistémico de acción preventiva y curativa. Actúa contra diversos hongos fitopatógenos.

Aplicar a cuello de planta o al sistema de riego tecnificado. Se toma la cantidad de **Floxil cu** recomendado. Llenar el tanque de aplicación a la altura de 3/4 del volumen con agua. Luego dejar caer lentamente el **Floxil cu** dentro del tanque, con el sistema de agitación en intenso movimiento. Completar el volumen requerido con agua.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**  
**USOS Y DOSIS:**

CULTIVO	ENFERMEDAD	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS	P.C (días)	L.M.R. (ppm)
			L/cilindro 200 L.		
Espárrago	Muerte regresiva	<i>Fusarium oxysporum</i>	0.5 - 1.0	10	5
Alto	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	0.55-0.75	14	20
Cebolla	Alternariosis	<i>Alternaria porri</i>	0.5	7	5
Arándano	Alternaria	<i>Alternaria alternata</i>	0.5	1	5
Papa	Alternaria	<i>Alternaria solani</i>	0.5	1	5
Arroz	Podredumbre de la vaina del arroz	<i>Gaeumannomyces graminis var. graminis</i>	0.3	7	10
Arándano	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	0.5	7	5

PC: Periodo de carencia en días. LMR: Límite máximo de residuos en partes por millón.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Aplicar cuando las condiciones sean las apropiadas para el desarrollo de la enfermedad. Realizar un máximo de una aplicación por campaña al año.

**PERIODO DE REINGRESO:**

No entre al área tratada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

Es compatible con la mayoría de plaguicidas, excepto con productos de marcada reacción alcalina, como azufres, aceites y otras inorgánicas.

**FITOTÓXICIDAD:**

No es fitotóxico a la dosis y uso recomendado.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características fisico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

