

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa daño temporal a los ojos.
- Causa irritación a la piel.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, la aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Benzoyl ureas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Si la irritación persiste consultar con el médico.
- En caso de ingestión no inducir al vómito. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconciente.
- En caso de inhalación, trasladar al paciente a un lugar fresco con ventilación natural.
- No tiene antídoto específico. El tratamiento médico es sintomático.
- En caso de emergencia llamar a:

ARIS INDUSTRIAL S. A. (01) 336 5428
CICOTOX (01) 0800 1 3040 y ALO ESSALUD (01) 0801 1 0200

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar de destinado por las autoridades locales para este fin.
- Los envases una vez usados, se deben acumular en sitios especiales para ellos, no botar en cualquier sitio mucho menos en los ríos.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos ó envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinado por las autoridades locales para este fin.

CAUTIVO 50 EC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Lufenuron..... 50 g/l
Aditivos.....c.s.p. 1 litro

Registro PQUA N° - SENASA

Titular del Registro: ARIS INDUSTRIAL S. A.



IMPORTADO POR: ARIS INDUSTRIAL S.A
Av. Industrial 491, Lima. Perú. - Telf.: 336 5428

DISTRIBUIDO POR: Fitocorp SAC



Calle Los Tejedores 187. Vulcano. Ate

FORMULADO POR: SINOCHEM NINGBO CHEMICALS CO., LTD

Domicilio: XIEPU TOWN, ZHENHAI DISTRICT, NINGBO, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA.

Oficina Central: 21 JIANGXIA STR., 315000 NINGBO CHINA

No de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :
Contenido Neto : 1 L



NO CORROSIVO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

GENERALIDADES

CAUTIVO 50 EC es un insecticida que actúa por ingestión, interrumpiendo la formación de quitina en el estadio larval del insecto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- Aplicar **CAUTIVO 50 EC** en aspersión, previa mezcla con agua, con pulverizadoras manuales, mecánicas o accionadas por tractor.
- Para preparar la mezcla, llene el tanque de preparación hasta la mitad con agua, agregue la dosis recomendada, agitar y completar el tanque con agua.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS

Cultivos	Plaga		Dosis		P.C. (días)	L.M.R (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/cil	L/ha		
Espárrago	Gusano de hoja	<i>Heliothis virescens</i>	0.1 – 0.2	0.3 – 0.6 *	20	0.02
Pimiento	Gusano de hoja	<i>Heliothis virescens</i>	-	0.7 *	7	1
Alcachofa	Gusano de hoja	<i>Heliothis virescens</i>	0.2	-	14	0.1

P.C.: Período de carencia en días
LMR: Límite máximo de residuos expresados en ppm.
* Considerar un gasto de agua por aplicación de 600 litros/ha

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda dos aplicaciones por campaña con intervalos entre aplicación de 7 días.
Aplicar tan pronto se observen los primeros estadios larvales de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a la dosis y usos recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los afines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

