

15 cm

10.5 cm

15 cm

10.5 cm

Evisect®-S

Evisect®-S

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezclas y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: análogo de la nereistoxina.

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel y los ojos lavarlos con abundante agua fresca, y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental suministrar carbón medicinal.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.

Antídoto: Aplicar una inyección intravenosa de 1-cysteine a las dosis de 12,5 a 25 mg por kilogramo de peso.

Teléfonos de emergencia toxicológica:

CICOTOX: 0800-1-3040

ALO EsSalud: 472-2300 (emergencias 24 horas)

Evisect®-S

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE - SP

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Thiocyclam-hydrogenoxalato 500 g/kg
Aditivos:.....c.s.p. 1 kg

Reg. N° 109-96-AG-SENASA

Importado y Distribuido por:

 **QSI**
QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL
DEL PERU S.A.



Av. República de Panamá 2577
La Victoria Lima - Perú.
Telf. 710-4000



Titular del Registro

Arysta LifeScience
Harmony In Growth

Av. Arenales 395 of. 603, Lima 1,
Telf. 332-6633

Formulado por:

FORMULACIONES QUÍMICAS S.A.
CHOMES-Punta Arenas
Telf.: 638-8283 - Costa Rica

Contenido Neto: 800 g

N° de Lote:

Fecha de Fab.:

Fecha de Exp.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**Moderadamente Peligroso
DAÑINO**

Evisect®-S

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, destruya este envase, y deposítelo en lo sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

No utilice este envase para conservar alimentos o agua

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrante del producto.

ESPEJOS GRAF SAC	FECHA:	25-07-2011	COLORES:	NEGRO	OBSERVACIONES:
	VERSION:	UV:1			
CLIENTE: QUIMICA SUIZA S.A.				PANT. AMARILLO C.	
				PANT. 293 C	
FORMATO: CAJA EVISECT - S x 800g				PANT. ROJO	
				QUIMICA SUIZA	
MEDIDAS: 170 mm x 150 mm x 105 mm	PROGRAMA:	COREL 14	OPERADOR:	JORGE QUISPE LUQUE	

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

EVISECT-S es un insecticida de una nueva estructura química relacionada con las neurotoxinas (sustancia natural presente en ciertos anélidos marinos: Lumbrineris spp.), con acción de contacto y estomacal, con efecto de penetración y translocación dentro del tejido de la hoja, lo cual ayuda a la acción estomacal. Controla insectos masticadores y minadores. Diluir la dosis indicada en 5 litros de agua aprox., agitar y verter esta pre mezcla en un cilindro o en el equipo de aplicación que contenga la cantidad de agua necesaria.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

USOS Y DOSIFICACIONES RECOMENDADAS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS Kg/ha	DOSIS Kg/cil	P.C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO				
Algodón	Perforador de la hoja	<i>Bucculatrix thurberiella</i>	0,5	—	15	0,02
	Gusano mayor de la hoja	<i>Alabama argillacea</i>				
	Gusano menor de la hoja	<i>Anomis texana</i>				
Tomate	Polilla	<i>Scrobipalpa absoluta</i>	0,70	0,35	15	3
	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0,30-0,40	0,15-0,20		
Alcachofa	Mosca Minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0,30-0,40	0,15-0,20	N.D.	3
	Gusano defoliador	<i>Heliothis virescens</i>				
Espárrago	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0,20-0,30	0,10-0,15	N.D.	3
	Gusano defoliador	<i>Copitarsia turbata</i>	0,20-0,40	0,10-0,20		
	Gusano Perforador	<i>Heliothis virescens</i>	0,30-0,40	0,15-0,20		
Ají, Pimiento	Gusano Perforador	<i>Heliothis virescens</i>	0,30-0,40	0,15-0,20	N.D.	3

P.C. Período de Carencia ND. No determinado

L.M.R. Límite máximo de residuo

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Para lograr mejores resultados tanto biológicos como económicos **EVISECT-S** debe aplicarse tan pronto como se observen los primeros daños en el cultivo.
La aplicación en el cultivo del algodón deberá efectuarse con estadios larvarios 1 y 2 y/o cuando el 10% de las plantas esté afectados.

En el cultivo de tomate aplicar con 10% de brotes infestados y/o con estadios larvarios 1 y 2.

PERÍODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación

COMPATIBILIDAD

Evisect-S es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, sin embargo en caso de duda es recomendable efectuar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

EVISECT-S no es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en éste envase corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



17 cm

17 cm