

160.00 mm

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

EVISCT®-S

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

Thiocyclam-hydrogenoxalato.....	500 g/kg
Aditivos.....	c.s.p. 1kg

Reg. N° 109-96-AG-SENASA



Arysta
LifeScience
Innovation. Agility. Results.

Innovation. Agility. Results.

SERFI S.A.
Av. República de Panamá 2577
La Victoria - Lima - Perú
Telf 710-4068

®Es marca registrada de Nippon Kayaku Co., Ltd.

NO CORROSIVO

NO INFLAMMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla.

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN.**
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
 - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Antidoto de la reserpina.
 - En caso de intoxicación, llama al médico inmediatamente o lleva el paciente al médico y muéstrale la etiqueta.
 - En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fue con la piel lavarse con abundante agua y jabón.
 - En caso de ingestión accidental administrar carbón medicinal.
 - No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- Antídoto:** Aplicar una inyección intravenosa de 1-cistatina a la dosis de 2.5 a 25 mg por kilogramo de peso.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106
CISPROQUIM: 080-050-847
Amvita LifeScience Perú S.A.C.: (01) 221-5729

CISPROQUIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inútilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: EVISECT[®]-S es un insecticida de una nueva estructura química relacionada con las neurotoxinas (sustancia natural presente en ciertos anélidos marinos;

minadores.
Diluir la dosis indicada en 5 litros de agua aproximadamente, agitar y verter esta pre mezcla en un cilindro o en el equipo de aplicación que contenga la cantidad de agua necesaria.

Consulte con un ingegnere agronomo

CULTIVO	Nombre común	PLAGA	Concentración de la infusión de la planta				PC (daño)	LMR (ppm)
			Nombre científico	Número	kg/L	%		
Ají, Pimiento	Guano perforador	<i>Heliothis virescens</i> <i>Lymantria monocarpus</i> <i>Lymantria monocarpus</i>	0.25-0.40	0.15-0.20	0.15-0.20	N.D.	3	
	Guano defoliador		0.25-0.40	0.15-0.20	0.15-0.20	N.D.	3	
	Profilador de la hoja		0.25-0.40	0.15-0.20	0.15-0.20	N.D.	3	
Algodón	Guano mayor de la hoja	<i>Alabama argemone</i> <i>Alabama argemone</i>	0.5	0.5	0.5	15	0.02	
	Guano de la hoja		0.5	0.5	0.5	15	0.02	
Cebolla	Trips	<i>Trips tabaci</i>	0.5	0.5	0.5	N.D.	3	
Espinargo	Guano defoliador	<i>Heliothis virescens</i>	0.25-0.40	0.15-0.20	0.15-0.20	N.D.	3	
	Guano copilador	<i>Synchlora frugiperda</i> <i>Spodoptera frugiperda</i> <i>Spodoptera frugiperda</i>	0.25-0.40	0.15-0.20	0.15-0.20	N.D.	3	
Granado	Trips	<i>Trips tabaci</i>	0.5	0.5	0.5	14	3	
	Trips del pallo	<i>Trips tabaci</i>	0.5	0.5	0.5	N.D.	3	
Palo	Polilla	<i>Heliothis humerotoides</i>	0.70	0.35	0.35	15	3	
Tomate	Moza blanca	<i>Trips tabaci</i>	0.25-0.40	0.15-0.20	0.15-0.20	14	3	
Vid	Trips	<i>Trips tabaci</i>	0.5	0.5	0.5	N.D.	0.01	
Papa	Polilla de la papa	<i>Phthorimaea operculella</i>	0.60	0.30	0.30	N.D.	0.01	
Yodo	Trips	<i>Trips tabaci</i>	0.25-0.30	0.15-0.20	0.15-0.20	N.D.	0.01	

LMB: Límite máximo de residuo

PC: Período de Carença

N.D.: No determinado

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Para lograr mejores resultados tanto biológicos como económicos EVISECT® debe aplicarse tan pronto como se observen los primeros daños en el cultivo. La aplicación en el cultivo de algodón debe efectuarse con estadíos larvarios 1 y 2 y cuando el 10% de las plantas está afectadas. En el cultivo de tomate aplicar con 10% de brotes afectados y con estadíos larvarios 1 y 2.

PERIODO DE REINGRESO: No entro a los Áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: EVISECT[®] es compatible con la mayoría de plaquiditas de uso común, sin embargo en caso de dudas recomendamos efectuar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: E/YESCT Si la aplicación de Dotis superiores al cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que se eficaz para los fines aquí recomendados, de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información consulte con el titular de registro o con el distribuidor del producto.