

160.00 mm

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

EVISECT®-S

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

Composición:

Thiocyclam-hydrogenoxalato.....500 g/kg
Aditivos.....c.s.p. 1kg

Reg. N° 109-96-AG-SENASA

Titular del Registro:

ARYSTA LIFESCIENCE PERÚ S.A.C.
Jr. Caracás N° 2226 Urb. Oyague
Jesus María - Lima - Perú



Formulador:

Nippon Kayaku Co., Ltd.
1-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo, Japón



Importador y Distribuidor:

SERFI S.A.
Av. República de Panamá 2577
La Victoria - Lima - Perú
Telf. 770-4068



Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido neto: 0.5 kg
Fecha de vencimiento:

®Es marca registrada de Nippon Kayaku Co., Ltd.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

190.00 mm

160.00 mm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Usar ropa protectora durante el manejo y aplicación para ingresar al área tratada con las primeras 24 horas.
- Evitar el contacto con los ojos, nariz, boca y piel.
- Evitar el uso de alimentos, medicinas, bebidas "forajoles".
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Análogo de la insectina.
- Ingestión: Lavar inmediatamente o llevar al paciente al médico y revelarle la etiqueta.
- Inhalación: Retirarse inmediatamente al aire libre y respirar libremente.
- En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental suministrar carbón medicinal.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Análisis: Aplicar una inyección intravenosa de 1-cilistina a la dosis de 12.5 a 25 mg por kilogramo de peso.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106 CISPROQUIM: 080-090-347 Arysta LifeScience Perú S.A.C.: (01) 221-5729

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inclínalo a fondo o bórralo cortándolo. Entregue o deséchelo en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobranos del producto.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobranos del producto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: EVISECT®-S es un insecticida de una nueva estructura química relacionada con las neurotoxinas (glutárico natural presente en ciertos anélidos marinos: miraflores spp.), con acción de contacto y estomacal, con efecto de penetración y translocación dentro del tejido de la hoja, le cual ayuda a la acción estomacal. Controla insectos masticadores y minadores.

Disuirla la dosis indicada en 5 litros de agua aproximadamente, agitar y verter esta pre mezcla en un cilindro o en el equipo de aplicación que contenga la cantidad de agua necesaria.

Consulte con un ingeniero agrónomo

CULTIVO	PLAGA	Nombre científico	DOSIS			PC (días)	LUR (ppm)
			Kg/ha	Kecil	%		
Alfalfa	Guano perforador	Heliothis virescens	0.30-0.40	0.15-0.20	-----	N.D.	3
	Mosca minadora	Trialeurodes vaporariorum	0.30-0.40	0.15-0.20	-----	N.D.	3
	Guano defoliador	Heliothis virescens	0.30-0.40	0.15-0.20	-----	N.D.	3
Algodón	Perforador de la hoja	Bucculatrix thurpeana	-----	-----	-----	15	0.02
	Guano mayor de la hoja	Alabama argillacea	-----	-----	-----	-----	-----
	Guano menor de la hoja	Alabama argillacea	-----	-----	-----	-----	-----
Cebolla	Thrips	Thrips tabaci	-----	0.1	0.05	N.D.	3
	Guano defoliador	Heliothis virescens	0.20-0.40	0.10-0.20	-----	N.D.	3
	Guano copulador	Spodoptera frugiperda	-----	-----	-----	-----	-----
Espinaca	Guano defoliador	Heliothis virescens	0.20-0.40	0.10-0.20	-----	N.D.	3
	Thrips	Thrips tabaci	-----	0.1	0.05	N.D.	3
	Thrips del tallo	Thrips tabaci	-----	0.15-0.20	0.075-0.1	14	3
Papa	Pavón	Heliothis virescens	-----	0.1	0.05	N.D.	3
	Thrips	Thrips tabaci	-----	0.15-0.20	-----	15	3
	Mosca blanca	Bemisia tabaci	0.30-0.40	0.15-0.20	-----	14	3
Vid	Thrips	Thrips tabaci	-----	0.1	0.05	N.D.	3
	Paleta de la papa	Phthorimaea operculella	0.60	-----	-----	N.D.	0.01
	Thrips	Thrips tabaci	0.20-0.30	-----	-----	N.D.	0.01

LUR: Límite máximo de residuo

PC: Período de Cereza

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Para lograr mejores resultados tanto biológicos como económicos EVISECT®-S debe aplicarse tan pronto como se observen los primeros daños en el cultivo. La aplicación en el cultivo de algodón deberá efectuarse con estadíos larvarios 1 y 2 y/o cuando el 10% de las plantas estén afectadas. En el cultivo de tomate aplicar con 10% de buena infestación y/o con estadíos larvarios 1 y 2.

PERÍODO DE REINGRESO: No entrar a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: EVISECT®-S es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, sin embargo en caso de dudas es recomendable efectuar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: EVISECT®-S al aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de uso, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



ET POLA N°109-96-AG-SENASA/004-0.5